

## بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شهر اصفهان با استفاده از شاخص‌های استاندارد

دکتر مهناز نیک آینین<sup>۱</sup>، مریم حاتم زاده<sup>۲</sup>، مرضیه وحید دستجردی<sup>۳</sup>، اکبر حسن زاده<sup>۴</sup>،  
زهرا موسوی<sup>۵</sup>، مهدی رفیعی<sup>۵</sup>

### خلاصه

**مقدمه:** شنا یکی از فعالیت‌های تفریحی است که اثرات سازنده‌ای در تأمین سلامت جسمی و روانی انسان دارد. در صورتی که استخرهای شنا به صورت مناسبی نگهداری، خدمت‌بخشی و پایش نشود، می‌تواند مشکلات بهداشتی زیادی مانند انتقال بیماری‌های عفونی را برای شناگران ایجاد نماید. هدف از این تحقیق، بررسی جامع آب استخرهای شهر اصفهان و مقایسه‌ی نتایج با استانداردهای موجود بود.

**روش‌ها:** در این تحقیق از ۲۵ استخر عمومی نمونه‌برداری شد. دما، کدورت، pH، کلر باقی‌مانده کمترین مطابقت را با استانداردهای موجود داشت. کلیفرم‌های کل و در رده‌ی بعدی پارامترهای میکروبی مورد ارزیابی شامل باکتری‌های شمارش پلیت هتروتروفی، کلیفرم کل و مدفوعی، استرپتوكوک مدفوعی، استافیلوکوک آرئوس و سودوموناس آنروزینورا بود.

**یافته‌ها:** در میان پارامترهای فیزیکوشیمیایی، pH و کلر باقی‌مانده کمترین مطابقت را با استانداردهای موجود داشت. کلیفرم‌های کل و در رده‌ی بعدی باکتری‌های هتروتروف و کلیفرم‌های مدفوعی به ترتیب شایع‌ترین باکتری‌های جدا شده از استخرهای شنا بود. ارتباط معنی‌داری بین کاهش کلر آزاد باقی‌مانده با افزایش باکتری‌های کلیفرم کل و شمارش پلیت هتروتروفی وجود داشت. همچنین ارتباط مستقیمی بین باکتری‌های کلیفرم کل با بقیه پارامترهای میکروبی وجود داشت.

**نتیجه‌گیری:** مطابقت کامل کیفیت آب استخرها با استاندارها به نسبت ضعیف بود و تنها یکی از استخرها در کل دوره‌ی نمونه‌برداری قادر دو شاخص میکروبی مهم یعنی کلیفرم‌های مدفوعی و سودوموناس آنروزینورا بود. همچنین پایش مداوم کلر باقی‌مانده همراه با تنظیم pH فاکتور مهمی در حفظ کیفیت باکتریولوژیکی مطلوب آب استخرهای شنا می‌باشد.

**وازگان کلیدی:** استخرهای شنا، کیفیت آب، شاخص‌های میکروبی، استاندارد.

شیمیایی و میکروبی در تأمین آب استخرها این ورزش سالم و مفرح را تبدیل به منبعی برای ابتلا به عوارض جسمانی مختلف مانند عفونت‌های میکروبی می‌نماید. گونه‌هایی از میکروارگانیسم‌ها ممکن است در آب استخرهای شنا یافت شوند که از راههای مختلف وارد آب استخر شده‌اند. در بسیاری از موارد، خطر بیماری یا عفونت ناشی از استخرهای شنا مرتبط با آلودگی مدفوعی آب است. آلودگی مدفوعی ممکن است در

### مقدمه

شنا یکی از ورزش‌های مهم جهت سلامت جسم و روح است؛ امروزه استخرها، به خصوص در فصول گرم سال، از پرطرفدارترین و جذاب‌ترین مراکز ورزشی به ویژه برای جوانان هستند. از دیدگاه بهداشتی، آب مورد استفاده برای استخرها مانند آب آشامیدنی بایستی از کیفیت خاصی برخوردار باشد؛ به طوری که عدم رعایت یک سری معیارهای فیزیکی،

<sup>۱</sup> استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

<sup>۲</sup> کارشناس میکروبیولوژی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

<sup>۳</sup> کارشناس ارشد بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

<sup>۴</sup> مری، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

<sup>۵</sup> کارشناس، مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

نویسنده‌ی مسؤول: دکتر مهناز نیک آینین، استادیار، گروه مهندسی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران.

مواد فرار در محیط‌های سرپوشیده ایجاد نماید (۱). از این رو، مدیریت مناسب و پایش مداوم استخرهای شنا به منظور اطمینان از کفايت روش‌های تصفیه و سالم بودن آب، امری ضروری و لازم به منظور حفاظت بهداشت عمومی به شمار می‌آید.

چندین فاکتور به عنوان شاخص کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب استخرها پیشنهاد شده است که با اندازه گیری آن‌ها می‌توان از سلامت کیفی آب استخر آگاهی حاصل نمود. فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی شامل درجه حرارت، کدورت، pH و کلر باقی‌مانده است؛ شاخص‌های میکروبی نیز باکتری‌های شمارش پلیت هتروتروفی (HPC) و باکتری‌های کلیفرم کل، به عنوان مهم‌ترین شاخص‌های کارایی گندزادایی، کلیفرم‌ها و استرپتوكوک‌های مدفعوعی، به عنوان نشانگر آلودگی مدفعوعی و همچنین استافیلوکوک آرئوس و سودوموناس آئروژینوزا، به عنوان شاخص‌های مخاطره‌ی بهداشتی آب استخر را در بر می‌گیرد.

با توجه به اهمیت بالای کیفیت آب استخرها در حفاظت سلامتی شناگران، مطالعه‌ی حاضر به منظور بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنای شهر اصفهان و مطابقت این شاخص‌ها با استانداردهای پیشنهاد شده انجام گردید.

## روش‌ها

به منظور بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شهر اصفهان، ۲۳۴ نمونه از ۲۵ استخر فعال سرپوشیده‌ی شهر به مدت تقریبی یک سال در سال ۱۳۸۵ گرفته شد. البته لازم به ذکر است که در بعضی از ماه‌های سال از بعضی استخرها به علت تعطیلی یا تعمیرات نمونه‌برداری انجام نشد.

اثر وجود شناگران، یا یک منبع آب آلوده و در استخرهای سرباز ناشی از آلودگی به فضولات حیوانی (به عنوان مثال پرنده‌گان و جوندگان) باشد. مواد مدفعوعی در اثر رها شدن اتفاقی و یا غیراختیاری ادرار و مدفعوع یا از طریق باقی‌مانده‌ی مواد مدفعوعی موجود بر روی بدن شناگران وارد آب استخر می‌گردد (۱). موارد زیادی از شیوع انتقال عفونت از آب استخرهای شنا گزارش شده که منبع عامل عفونی، گونه‌ای از میکروارگانیسم‌های پاتوژن شامل باکتری‌ها، ویروس‌ها و انگل‌های تک یا ختہ‌ای بوده است (۲-۶). ترشحات غیرمدفعوعی انسانی، مانند بzac یا آب دهان، ترشحات پوستی و ترشحات مخاط، نیز منبع بالقوه‌ای از میکروارگانیسم‌های پاتوژن هستند. افراد مبتلا می‌توانند به صورت مستقیم آب استخر یا جکوزی‌ها و سطوح اشیاء و تسهیلات استفاده شده در استخر را با پاتوژن‌ها (به ویژه ویروس‌ها و قارچ‌ها) آلوده سازند، که ممکن است منجر به عفونت پوست در دیگر افراد در تماس با آب یا سطوح آلوده شود. پاتوژن‌های فرصت‌طلب، به ویژه باکتری‌ها، می‌توانند از سطح بدن افراد آلوده آزاد شده، از طریق آب یا سطوح آلوده منتقل گردد (۱). از این گروه پاتوژن‌ها می‌توان به سودوموناس آئروژینوزا اشاره نمود که موجب عفونت گوش خارجی (۷) و فولیکولیتیس (۸) می‌گردد. به هر حال می‌توان از شیوع بسیاری از بیماری‌های منتقله از طریق آب استخرهای شنا، با مدیریت صحیح و پایش مؤثر و دائمی جلوگیری نمود یا آن را کاهش داد (۹، ۱).

علاوه بر مخاطرات میکروبی، مواد شیمیایی استفاده شده جهت تصفیه و ضدعفونی آب استخرهای شنا نیز ممکن است بر اساس طبیعت خود یا بعد از واکنش با مواد موجود در آب خطراتی را برای شناگران یا کارکنان استخرها از طریق تماس پوستی و یا تنفس

قابل حمل استفاده شد. کدورت و هدایت الکتریکی نیز با دستگاه کدورت سنج و هدایت سنج Hatch اندازه گیری گردید.

**پارامترهای میکروبی:** پارامترهای میکروبی مورد ارزیابی شامل باکتری‌های شمارش پلیت هتروتروفی، کلیفرم‌های کل، کلیفرم مدفعوعی، استرپتوکوک مدفعوعی، استافایلوکوک آرئوس و سودوموناس آنروژینوزا بود. جهت سنجش باکتری‌های هتروتروفی از محیط کشت agar R2A (نگهداری نمونه‌ها به مدت ۴۸-۷۲ ساعت در ۳۷ درجه سانتی‌گراد) استفاده شد. بقیه آزمایشات میکروبی به روش چند لوله‌ای بر اساس دستورالعمل ذکر شده در استاندارد متدهای انجام گرفت (۱۰).

#### یافته‌ها

نتایج حاصل از اندازه گیری پارامترهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی به تفکیک استخرهای مورد بررسی، به ترتیب در جداول ۱ و ۲ ارائه شده است. شکل‌های نمودارهای ۱ و ۲ نیز به ترتیب نشان‌دهنده‌ی درصد نمونه‌ها در محدوده‌های متفاوت کلر باقی‌مانده‌ی آزاد و pH آب استخرها می‌باشد. با توجه به این نمودارها مشخص می‌گردد که در میان نمونه‌های مورد بررسی تنها ۵۷ درصد دارای کلر آزاد باقی‌مانده‌ی بالاتر از pH ۱ بودند و ۲۳ نمونه‌ها نیز در گستره‌ی pH استاندارد ۷/۲-۷/۸ (pH: ۷/۲-۷/۸) قرار داشتند.

در نمودار شماره‌ی ۳ درصد نمونه‌های آلوده به کلیفرم مدفعوعی و سودوموناس آنروژینوزا، که دو شاخص مهم در ارزیابی کیفیت آب استخرها می‌باشند، به تفکیک استخرهای مورد نمونه برداری نشان داده شده است. با توجه به این نمودار مشخص می‌گردد که تنها استخر شماره‌ی ۵ در تمام نمونه‌ها عاری از این دو میکروب بوده است.

**نمونه برداری:** به منظور بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی و ارزیابی تغییرات احتمالی این پارامترها در طول استخر، نمونه برداری در دو ناحیه‌ی ورود آب به استخر و خروج آن انجام گردید. اما، جهت بررسی پارامترهای میکروبی تنها نمونه برداری از محل خروجی آب استخرها صورت گرفت. شیشه‌ها با زاویه ۴۵° به صورت عمودی تا عمق حدود ۲۵ سانتی‌متری وارد آب شده، پر گردید؛ به نحوی که تیوسولفات سدیم موجود در شیشه‌های مورد استفاده برای سنجش کیفیت میکروبی از شیشه خارج نشود.

نمونه‌های برداشت شده برای سنجش پارامترهای فیزیکوشیمیایی در بطری‌های درپیچ‌دار ۱۰۰ میلی‌لیتری جمع‌آوری شد و برای پارامترهای میکروبی از بطری‌های ۲۵۰ میلی‌لیتری استریل حاوی تیوسولفات سدیم با غلظت نهایی ۱۰۰ mg/l استفاده گردید. پس از نمونه برداری و انجام آزمایشات لازم در محل، نمونه‌ها در Cold box به آزمایشگاه منتقل شد و بلافضله مورد آزمایش قرار گرفت. در صورت تأخیر در آزمایش، نمونه‌ها تا زمان آزمایش در یخچال (۴ °C) نگهداری می‌شد.


در زمان نمونه برداری پرسشنامه‌ای نیز جهت جمع آوری یک سری اطلاعات شامل تعداد شناگران در ساعت و روز نمونه برداری، رنگ آب و وجود لایه‌ی چربی بر روی آب توسط نمونه بردار تکمیل می‌گردید.

**پارامترهای فیزیکو شیمیایی:** پارامترهای فیزیکوشیمیایی اندازه گیری شده شامل دمای هوا و آب استخرها، کدورت، pH، هدایت الکتریکی و کلر باقی‌مانده‌ی آزاد آب بود که به جز کدورت و هدایت الکتریکی، بقیه پارامترها در محل سنجش شد. جهت سنجش کلر از کیت کلرسنج Diethyl-p- (DPD) و برای سنجش pH از pH متر pheylenediumine

جدول ۱. میانگین و انحراف معیار پارامترهای فیزیکوشیمیایی (به تفکیک استخرهای مورد نمونه برداری)

شماره استخراج	درجة حرارت هوای (°C)	درجة حرارت آب (°C)	کلر آزاد (mg/l)	*pH	کدورت (NTU)	هدایت الکتریکی (μmho/cm)
۱	۲۹/۸ ± ۱/۰۷	۲۷/۹ ± ۰/۷	۱ ± ۰/۷	۷/۲-۸/۶	۰/۲ ± ۰/۲	۷۹۵ ± ۳۰۰
۲	۲۹/۶ ± ۱/۱۷	۲۸/۵ ± ۰/۷	۰/۷ ± ۰/۲	۷/۴-۸/۴	۰/۲ ± ۰/۳	۳۹۴ ± ۲۳۵
۳	۲۹/۶ ± ۱/۶۵	۲۸/۴ ± ۱	۰/۸ ± ۰/۳	۸-۸/۵	۰/۲ ± ۰/۳	۴۳۶ ± ۱۳۱
۴	۲۹/۴ ± ۱/۷۷	۲۷/۷ ± ۰/۸۲	۰/۶ ± ۰/۳	۷/۳-۸/۴	۰/۲ ± ۰/۵	۱۵۴۹ ± ۴۱۱
۵	۳۱/۱ ± ۱/۰۵	۲۸/۶ ± ۱/۱۱	۰/۷ ± ۰/۱	۷/۶-۸/۴	۰/۱ ± ۰/۱	۷۲۸ ± ۴۵۹
۶	۲۹ ± ۲/۶۲	۲۸ ± ۲/۴۴	۰/۳ ± ۰/۳	۷/۴-۸/۴	۰/۲ ± ۰/۳	۶۴۱ ± ۳۰۹
۷	۳۰/۲ ± ۰/۹۷	۲۸/۲ ± ۱/۲۵	۰/۸ ± ۰/۲	۷/۴-۸/۱	۰/۱ ± ۰/۱	۴۵۲ ± ۲۷۷
۸	۳۰/۲ ± ۰/۹۷	۲۸/۳ ± ۱/۰۵	۰/۸ ± ۰/۳	۷/۸-۸/۴	۰/۴ ± ۰/۸	۱۳۰۷ ± ۳۷۷
۹	۲۹/۸ ± ۱/۹۶	۲۸/۳ ± ۲/۶۴	۰/۷ ± ۰/۴	۷/۴-۸/۴	۰/۱ ± ۰/۲	۵۹۸ ± ۳۴۱
۱۰	۳۰/۵ ± ۱/۷۷	۲۸/۱ ± ۱/۱	۰/۷ ± ۰/۴	۷/۴-۸/۴	۰/۱ ± ۰/۲	۳۸۷ ± ۱۵۴
۱۱	۲۸/۸ ± ۲/۶۴	۲۹/۱ ± ۲/۹۹	۱/۷ ± ۰/۵	۷/۹-۹/۳	۰/۱ ± ۰/۲	۱۴۳۹ ± ۳۷۱
۱۲	۲۸/۴ ± ۱/۸۷	۲۶/۷ ± ۲/۴۳	۱/۴ ± ۰/۸	۸/۲-۸/۹	۰/۶ ± ۰/۶	۵۹۷ ± ۱۱۵
۱۳	۲۸/۴ ± ۲/۳۵	۲۶/۳ ± ۲	۰/۲ ± ۰/۲	۷/۱-۸/۹	۰/۲ ± ۰/۲	۳۹۷ ± ۱۰۳
۱۴	۲۶/۸ ± ۳/۰۶	۲۸/۵ ± ۳/۳۹	۰/۲ ± ۰/۲	۷/۶-۹	۰/۲ ± ۰/۲	۱۰۲۲ ± ۳۱۱
۱۵	۲۸/۳ ± ۲/۱۶	۲۹/۲ ± ۱/۳۳	۰/۸ ± ۰/۶	۷/۶-۸/۷	۰/۲ ± ۰/۲	۱۰۱۹ ± ۲۹۲
۱۶	۲۸/۳ ± ۳/۱	۲۷/۱ ± ۱/۸۳	۱/۵ ± ۰/۷	۶/۶-۸/۹	۰/۴ ± ۰/۸	۵۱۵ ± ۲۷۲
۱۷	۲۶/۶ ± ۲/۶۶	۲۷/۱ ± ۱/۸۳	۱/۹ ± ۰/۳	۷/۹-۹/۴	۰/۲ ± ۰/۴	۵۸۰ ± ۱۲۵
۱۸	۲۷/۴ ± ۲/۸۷	۲۷/۷ ± ۱/۵	۰/۲ ± ۰/۳	۷/۶-۸/۹	۰/۲ ± ۰/۳	۶۴۱ ± ۲۸۹
۱۹	۲۸/۶ ± ۲/۳۱	۲۷/۹ ± ۱/۲۵	۱/۴ ± ۰/۹	۶/۵-۸/۷	۰/۲ ± ۰/۲	۶۵۹ ± ۱۲۰
۲۰	۲۶/۳ ± ۳/۲۵	۲۷/۶ ± ۱/۶۵	۰/۳ ± ۰/۴	۷/۱-۹/۲	۰/۳ ± ۰/۴	۵۴۶ ± ۱۴۰
۲۱	۲۸/۵ ± ۲/۳۴	۲۸/۷ ± ۱/۳۴	۰/۸ ± ۱	۶/۱-۸/۹	۰/۳ ± ۰/۳	۷۱۲ ± ۳۳۱
۲۲	۲۷/۹ ± ۲/۳۵	۲۸/۶ ± ۱/۵	۱/۴ ± ۱	۷/۲-۹/۲	۰/۴ ± ۰/۴	۳۲۱ ± ۶۳
۲۳	۲۶/۷ ± ۲/۵۴	۲۷/۶ ± ۲/۵۶	۱/۱ ± ۰/۷	۶/۲-۸/۶	۰/۳ ± ۰/۳	۱۰۶۲ ± ۲۰۴
۲۴	۲۹/۸ ± ۱/۷۷	۲۸/۳ ± ۰/۹۹	۲ ± ۰/۳	۷/۲-۹/۱	۰/۳ ± ۰/۳	۱۶۷۹ ± ۵۹۷
۲۵	۲۸/۱ ± ۳/۰۱	۲۸ ± ۱/۴۱	۱/۸ ± ۰/۴	۶/۵-۸/۹	۰/۲ ± ۰/۲	۷۴۳ ± ۲۱۵
کل	۲۸/۷ ± ۲/۴۴	۲۷/۹ ± ۱/۷۷	۱/۲ ± ۰/۷	۶/۱-۹/۴	۰/۲ ± ۰/۴	۷۶۷ ± ۴۵۵

\*: گستره




نمودار ۱. درصد نمونه‌ها در محدوده‌های متفاوت کلر باقیمانده‌ی آزاد آب استخرها


جدول ۲. میانگین و انحراف معیار پارامترهای میکروبی (به تفکیک استخرهای مورد نمونه برداری)

شماره استخر	HPC* / ml (تعداد)	کلیفرم کل / ۱۰۰ ml (تعداد)	کلیفرم مدفوعی / ۱۰۰ ml (تعداد)	استریتوکوک مدفوعی / ۱۰۰ ml (تعداد)	آرتوس آرتوزینوزا استافیلوکوک / ۱۰۰ ml (تعداد)	گونه های استافیلوکوک / ۱۰۰ ml (تعداد)	سودوموناس آئروژینوزا / ۱۰۰ ml (تعداد)
۱	۵->۱۰۰۰	۴۵±۱۱/۵	۱/۴±۲/۵	۰/۳±۱/۱	۰/۸±۲/۷	۰/۷±۲/۲	۰/۷±۲/۲
۲	۰->۱۰۰۰	۲/۳±۳/۴	۰/۶±۱/۳	۰	۰/۳±۰/۹	۱/۴±۳/۳	۱/۴±۲/۲
۳	۰->۱۰۰۰	۰/۷±۱/۵	۰	۰	۲/۵±۳/۴	۲/۲±۴/۴	۶/۲±۱۷/۶
۴	۰-۶۴۰	۱±۲/۵	۰/۳±۰/۹	۰	۰/۴±۱/۱	۰/۴±۵/۳	۲/۴±۵/۳
۵	۴۰->۱۰۰۰	۲/۲±۳/۶	۰	۰	۰	۰/۴±۱/۲	۰
۶	۵->۱۰۰۰	۸/۹±۱۴	۳/۷±۶	۰	۰/۴±۱/۱	۱/۲±۲/۹	۱/۲±۲/۹
۷	۰->۱۰۰۰	۳/۹±۳/۸	۱/۵±۱/۷	۰	۰/۷±۱/۵	۰	۰
۸	۰->۱۰۰۰	۴/۱±۷/۷	۱/۶±۳	۰	۱/۴±۲/۳	۱/۲±۳	۱/۲±۳
۹	۸->۱۰۰۰	۳±۳/۹	۰/۸±۲/۴	۱±۲	۰/۷±۱/۵	۱/۳±۳	۱/۷±۴
۱۰	۰->۱۰۰۰	۲/۳±۳	۱/۴±۱/۸	۰	۰/۳±۰/۹	۰/۴±۶/۳	۲/۴±۶/۳
۱۱	۳->۱۰۰۰	۱/۹±۳/۷	۰/۳±۱	۰	۰/۴±۱/۲	۰/۴±۱/۲	۰
۱۲	۷۵->۱۰۰۰	۱/۴±۲/۵	۱/۴±۲/۵	۰	۰/۹±۲/۹	۰/۹±۲/۹	۰
۱۳	۰-۲۵۳	۳/۲±۵	۳/۲±۵	۰	۱/۵±۲/۹	۱/۵±۲/۹	۰
۱۴	۵->۱۰۰۰	۱/۷±۱/۸	۰/۹±۱/۶	۰	۰/۹±۱/۷	۰/۹±۲/۳	۱/۱±۲/۳
۱۵	۰->۱۰۰۰	۱/۶±۳	۰/۴±۱/۳	۰	۰	۰	۳/۴±۶/۳
۱۶	۰->۱۰۰۰	۱/۸±۲/۲	۳/۱±۴/۸	۱±۳	۰/۸±۲/۴	۰/۸±۴/۷	۱/۵±۴/۷
۱۷	۰->۱۰۰۰	۳/۶±۷	۰/۷±۱/۴	۰	۰/۷±۱/۵	۰/۹±۲/۹	۰/۹±۲/۹
۱۸	۰->۱۰۰۰	۱/۸±۲/۲	۱/۸±۱/۵	۰	۱/۱±۱/۷	۱/۱±۲/۹	۱/۹±۲/۹
۱۹	۰->۱۰۰۰	۳/۶±۷	۱/۴±۳/۵	۰	۰/۸±۱/۴	۰/۸±۹/۲	۰/۹±۹/۲
۲۰	۱۰->۱۰۰۰	۲/۱±۴/۷	۰/۶±۱/۳	۰	۰/۴±۱/۱	۰/۴±۷/۹	۳/۵±۷/۹
۲۱	۱۰->۱۰۰۰	۱۶/۲±۳۱/۸	۲/۱±۳/۳	۳±۴/۶	۰/۸±۷/۹	۰/۸±۴/۲	۱/۹±۴/۲
۲۲	۰-۶۲۰	۶/۳±۱۳/۲	۵±۱۳/۴	۱/۳±۲/۲	۱/۵±۴/۷	۱/۵±۰/۹	۰/۳±۰/۹
۲۳	۰->۱۰۰۰	۱/۳±۳	۰	۰/۴±۱/۱	۲±۳/۵	۱±۲/۴	۰/۳±۰/۹
۲۴	۱۰->۱۰۰۰	۳۵/۷	۵±۱۳/۴	۹/۶±۱۴/۷	۰	۰	۲۲±۶۶

\* گستره



نمودار ۲. درصد نمونه‌ها در محدوده‌های مختلف pH آب استخرها



نمودار ۳ درصد نمونهای آلوده به کلیفرم مدفوعی و سودوموناس آئروژینوزا (به تفکیک استخرهای مورد نمونه برداری)

( $P < 0.05$ ). همچنین ارتباط مستقیمی بین باکتری‌های کلیفرم کل با بقیه‌ی پارامترهای میکروبی وجود داشت. در این مطالعه، تفاوت مشخصی در کیفیت میکروبی آب در بین فصول مختلف سال وجود نداشت؛ همچنین تفاوت معنی‌داری در پارامترهای فیزیکو‌شیمیایی در طول استخر حاصل نگردید.

جدول شماره‌ی ۳ نشان دهنده‌ی درصد مطابقت نمونه‌ها در مورد هر یک از پارامترهای شاخص با معیارها و استانداردها می‌باشد.

آنالیز آماری نتایج نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین کاهش کلر آزاد باقی‌مانده و افزایش باکتری‌های کلیفرم کل و شمارش پلیت هتروترفی وجود دارد

جدول ۳. مطابقت پارامترهای اندازه‌گیری شده با معیارها و استانداردهای ارائه شده

پیشنهادی (شماره منبع)	مطابقت با استاندارد (درصد نمونه‌ها)	مقادیر استاندارد	پارامتر
(۱) WHO	۸۷	۰/۵ $\geq$	کدورت (NTU)
(۱) WHO	۲۳	۷/۲-۷/۸	pH
(۱) WHO	۵۷	۱ $\leq$	کلر آزاد باقی‌مانده
(۱) WHO	۶۳	۲۰۰ $>$	HPC (تعداد در میلی‌لیتر)
(۹) DIN*	۶۲	۰	کلیفرم‌های کل (تعداد در ۱۰۰ ml)
(۱) WHO	۷۷	۱ $>$	کلیفرم‌های مدفوعی (تعداد در ۱۰۰ ml)
استاندارد ایران (۲۲)	۱۰۰	۱۰۰	استرپتوکوک مدفوعی (تعداد در ۱۰۰ ml)
(۱) WHO	۱۰۰	۱۰۰ $>$	استاگلیوکوک آرئوس (تعداد در ۱۰۰ ml)
(۱) WHO	۸۱	۱ $>$	سودومonas آئروژینوزا (تعداد در ۱۰۰ ml)

\* استاندارد آلمان (DIN 1943, 1984)

## بحث

باقي مانده کمتر از  $1 \text{ mg/l}$  بود (۱۴). به هر حال، ذکر این نکته ضروری است که تنها غلظت کلر باقی مانده عامل مؤثر برای گندздایی نیست، بلکه برای دستیابی به حداکثر کارایی گندздایی با کلر، تنظیم  $\text{pH}$  امری ضروری و اجتناب ناپذیر است (۱).  $\text{pH}$  بالای آب علاوه بر آن که موجب سوزش و تحریک چشم می‌گردد، کارایی کلر را نیز بسیار کاهش می‌دهد؛ به نحوی که در  $\text{pH}$  برابر با ۸ تنها ۲۰ درصد از کلر به صورت اسید هیپوکلرو که ضدعفونی کنندهٔ مؤثری است، می‌باشد (۱). در مطالعهٔ حاضر مشکل استخراهای مورد بررسی در کنترل  $\text{pH}$  حائز اهمیت است؛ به گونه‌ای که در همهٔ استخراها درصد بالایی از نمونه‌های گرفته شده دارای  $\text{pH}$  بالاتر از  $7/8$  و یا حتی  $8$  بود و در هیچ کدام از استخراها در طول دورهٔ بررسی،  $\text{pH}$  به طور کامل در محدوده  $7/2-7/8$  نبود. مطالعهٔ انجام شده بر روی استخراهای فلوراید، نشان می‌دهد که  $84/4$  درصد از استخراها دارای  $\text{pH}$  در حد استاندارد پیشنهاد شده بوده، تنها  $12/7$  درصد دارای  $\text{pH}$  بیش از  $7/8$  می‌باشد (۱۴). در بررسی آماری نتایج، از  $243$  نمونهٔ گرفته شده،  $147$  نمونه ( $62/8$  درصد) با استانداردهای میکروبی ارائه شده در جدول ۳ مطابقت نداشت که از این تعداد،  $66$  نمونه ( $28$  درصد) دارای کلر آزاد باقی ماندهٔ بالای  $1 \text{ mg/l}$  بود و تنها  $16$  نمونه ( $6/8$  درصد) کلر آزاد بالای  $1 \text{ mg/l}$  و  $\text{pH}$  در محدوده  $7/2-7/8$  داشت. با کنترل  $\text{pH}$  از یک طرف می‌توان به کارایی مطلوب مادهٔ گندزا دست یافت و از طرف دیگر از مصرف مقادیر بیش از حد کلر، که خود عاملی بالقوه در ایجاد مخاطرات تنفسی (۱۵-۱۶) و آلرژی (۱۷-۱۸) است، اجتناب ورزید.

بررسی پارامترهای میکروبی نشان می‌دهد که

استفاده از استخراهای شنا به صورت روز افزونی در حال گسترش است؛ به همین سبب نگهداری و پایش نامناسب آن‌ها می‌تواند مخاطرات زیادی را از نظر بهداشت عمومی ایجاد نماید. بررسی نتایج تحقیقات انجام شده در مورد استخراهای شنا و وضعیت بهداشتی آن‌ها نتایج متغیری را نشان می‌دهد. در تحقیق حاضر در میان پارامترهای فیزیکوشیمیایی مورد بررسی،  $\text{pH}$  و کلر باقی ماندهٔ آزاد کمترین مطابقت را با معیارهای موجود داشت. با بررسی نتایج مشخص گردید که  $14/3$  درصد نمونه‌ها دارای کلر کمتر از  $1 \text{ mg/l}$  و  $43$  درصد نمونه‌ها دارای کلر کمتر از  $1 \text{ mg/l}$  می‌باشند؛ به عبارت دیگر، در نزدیک به نیمی از نمونه‌های گرفته شده، کلر آزاد در حد کافی برای گندздایی وجود نداشته است. نتایج حاصل از هر یک از استخراها نیز نشان می‌دهد که تنها  $6$  استخ در تمام موارد حاوی کلر باقی ماندهٔ بالاتر از  $1 \text{ mg/l}$  بوده‌اند. در مطالعهٔ مهدی نژاد بر روی استخراهای شهر گرگان نیز  $61/1$  درصد نمونه‌ها حاوی کلر باقی ماندهٔ کمتر از  $1 \text{ mg/l}$  بوده‌اند (۱۱). میانگین کل کلر آزاد باقی مانده در این تحقیق برابر با  $1/2 \text{ mg/l}$  بود که در مقایسه با مطالعهٔ انجام شده در زاهدان، با میانگین  $1/9 \text{ mg/l}$  بالاتر می‌باشد (۱۲). در مطالعهٔ حجارتبار بر روی استخراهای شهر تهران میانگین کلر آزاد،  $1/3 \text{ mg/l}$  در استخراها برآورد شد (۷). مطالعهٔ انجام شده در آتن نیز نشان داد که تنها در  $27$  درصد از نمونه‌های برداشت شده، استاندارد آلمان (DIN 1943, 1984) در مورد کلر آزاد رعایت شده است (۱۳)؛ اما در مطالعهٔ Rakestraw و همکاران از  $486$  استخ مورد مطالعه در فلوریدا تنها در  $22$  درصد موارد مقدار کلر آزاد

به یکی از شاخص‌های میکروبی آلوده بود. در یک مطالعه بر روی ۴۶ استخر شنا در ساحل غربی فلسطین، تمام استخرها حداقل به وسیله‌ی یکی و ۱۷ مورد (۳۷) درصد) به وسیله‌ی دو یا بیشتر از شاخص‌های میکروبی آلوده شده بود (۱۹). در مطالعه‌ای دیگر بر روی استخرهای شهر Bologna در ایتالیا، ۳۴/۲ درصد نمونه‌ها با استانداردهای میکروبی ارائه شده مطابقت نداشت؛ البته در این مطالعه بر طبق استاندارد ایتالیا استرپتوکوک مدافوعی نبایستی در نمونه‌ها وجود می‌داشت و مقدار مجاز استافیلوکوک آرئوس نیز ۱۰ میکروارگانیسم در ۱۰۰ میلی‌لیتر بود (۹).

آزمون همبستگی Pearson نشان داد که ارتباط معکوسی بین کلر باقی‌مانده‌ی آزاد و باکتری‌های کلیفرم کل و همچنین شمارش پلیت هتروتروفی وجود دارد که این ارتباط در مطالعه‌ی Rakestraw و همکاران نیز مشخص گردید (۱۴). مطالعه‌ی انجام گرفته توسط Martins و همکاران بر روی استخرهای شنا در آمریکای جنوبی نیز نشان داد که ارتباط معکوسی بین میزان کلر باقی‌مانده‌ی آزاد با تمام میکروارگانیسم‌های مورد ارزیابی (کلیفرم کل، کلیفرم مدافوعی، استافیلوکوک آرئوس، استرپتوکوک مدافوعی، سودوموناس آئروژینوزا و شمارش پلیت هتروتروفی) وجود دارد (۲۰). مطالعات Ibarluzea و همکاران نیز نشان داد که تنها متغیر قابل پیش‌بینی که می‌تواند نشان دهنده‌ی قابل اطمینان بودن آب از لحاظ میکروبی باشد، غلظت گندزدا است (۲۱). در مطالعه‌ی Rakestraw و همکاران نیز مشخص گردید که کلر آزاد، همراه با شفاقت آب می‌تواند به عنوان تنها معیار جهت قضاوت درباره‌ی اطمینان بخش بودن آب از لحاظ باکتریولوژیکی استفاده شود (۱۴).

با توجه به ارتباط معکوس بین میزان کلر آزاد

بیشترین درصد باکتری‌های جداسده مربوط به کلیفرم‌های کل بوده و درصد مطابقت پارامترهای میکروبی با مقادیر استاندارد از ۶۲-۱۰۰ درصد تغییر داشته است. مطالعه‌ی Rigas و همکاران بر روی ۱۱ استخر سر پوشیده و روباز شهر آتن نشان داد که درصد مطابقت نمونه‌ها با استانداردهای میکروبی از ۴۵-۹۱ درصد متغیر بوده و سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوک آرئوس شایع‌ترین باکتری‌ها در استخرهای شنا بوده‌اند؛ در حالی که در مطالعه‌ی حاضر کلیفرم‌های کل و در رده بعدی باکتری‌های هتروتروف (HPC) و کلیفرم‌های مدافوعی به ترتیب شایع‌ترین باکتری‌های جدا شده از استخرهای شنا بوده‌اند و کمترین درصد جداسازی (۳ درصد) مربوط به باکتری‌های استرپتوکوک مدافوعی می‌باشد. درصد جداسازی استافیلوکوک آرئوس و سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب برابر ۱۹ و ۱۳ درصد بود، اما میزان شمارش استافیلوکوک آرئوس در هیچ یک از نمونه‌ها بالاتر از حد استاندارد ۱۰۰ در میلی‌لیتر، نبود. در مطالعه‌ی حجاربار بر روی استخرهای شهر تهران، سودوموناس آئروژینوزا در ۶۳/۳ درصد نمونه‌ها یافت گردید؛ در حالی که تنها ۱۸/۶ درصد نمونه‌ها حاوی کلیفرم‌های کل، مدافوعی و HPC بودند (۷). در این بررسی تنها در استخر شماره‌ی ۵ در تمام نمونه‌های مورد بررسی شمارش کلیفرم مدافوعی، استرپتوکوک مدافوعی، استافیلوکوک آرئوس و سودوموناس آئروژینوزا برابر صفر بود و بقیه‌ی استخرها در کل دوره‌ی مطالعه نتوانسته‌اند به صورت کامل با معیارهای میکروبی پیشنهادی مطابقت داشته باشند. از ۲۴۳ نمونه مورد بررسی، ۱۴۷ نمونه (۶۲/۸ درصد) نتوانست با استانداردهای میکروبی مطابقت داشته باشد و حداقل

کل تا حد بالایی از کیفیت باکتریولوژیک مناسب آب استخر اطمینان حاصل نمود.

### تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان مقاله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت فراهم نمودن بودجه طرح کمال تشکر را دارند. هم چنین از سرکار خانم پورسعید و آقای غیور به دلیل همکاری گسترده در انجام این طرح تشکر می‌گردد.

باقی مانده‌ی آب با کلیفرم‌های کل و باکتری‌های شمارش پلیت هتروتروفی، مانند تحقیقات دیگر می‌توان نتیجه گرفت که مقدار کلر آزاد باقی‌مانده فاکتور مؤثری در نابودی باکتری‌ها می‌باشد و بایستی به طور دائم در استخرها پایش گردد؛ به علاوه جهت دستیابی به کارایی مطلوب ماده‌ی گندزدا کنترل دقیق pH همراه با پایش کلر باقی‌مانده ضروری است. همچنین با توجه به ارتباط مستقیم بین باکتری‌های کلیفرم کل با بقیه‌ی شاخص‌های میکروبی، می‌توان با پایش دائم کلیفرم‌های

### References

1. World Health Organization. Guidelines for Safe Recreational Water Environments. Geneva: WHO Press; 2006.
2. Friedman MS, Roels T, Koehler JE, Feldman L, Bibb WF, Blake P. Escherichia coli O157:H7 outbreak associated with an improperly chlorinated swimming pool. Clin Infect Dis 1999; 29(2): b298-303.
3. CDC. Shigellosis outbreak associated with an unchlorinated fill-and-drain wading pool-Iowa, 2001. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2001; 50(37): 797-800.
4. Mahoney FJ, Farley TA, Kelso KY, Wilson SA, Horan JM, McFarland LM. An outbreak of hepatitis A associated with swimming in a public pool. J Infect Dis 1992; 165(4): 613-8.
5. Maunula L, Kalso S, Von Bonsdorff CH, Ponka A. Wading pool water contaminated with both noroviruses and astroviruses as the source of a gastroenteritis outbreak. Epidemiol Infect 2004; 132(4): 737-43.
6. Bell A, Guasparini R, Meeds D, Mathias RG, Farley JD. A swimming pool-associated outbreak of Cryptosporidiosis in British Columbia. Can J Public Health 1993; 84(5): 334-7.
7. Hajjartabar M. Poor-quality water in swimming pools associated with a substantial risk of otitis externa due to *Pseudomonas aeruginosa*. Water Sci Technol 2004; 50(1): 63-7.
8. CDC. *Pseudomonas* dermatitis/folliculitis associated with pools and hot tubs -Colorado and Maine, 1999-2000. JAMA 2001; 285: 157-58.
9. Leoni E, Legnani P, Guberti E, Masotti A. Risk of infection associated with microbiological quality of public swimming pools in Bologna, Italy. Public Health 1999; 113(5): 227-32.
10. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation, Water Environment Federation. Standard methods for the examination of water and wastewater: including bottom sediments and sludges. Washington, DC: American Public Health Association; 1981.
11. Mehdinejad MM. An investigation on health indicators of Gorgan swimming pool waters. Proceedings of the 7<sup>th</sup> national congress on environmental health; 2004 Sep 14-16; Shah-e-kord, Iran.
12. Sohrabi A, Qureshi MI, Dehdar M, Rakhsh Khorshid A. Study of fungal and bacterial contamination of Zahedan indoor swimming pools. Proceedings of the 6<sup>th</sup> national congress on environmental health; 2003 Oct 22-24; Sari, Iran. 2003.
13. Rigas F, Mavridou A, Zacharopoulos A. Water quality of swimming pools in Athens area. Int J Environ Health Res 1998; 8(3): 253-60.
14. Rakestraw LF, Nelson GD, Flanery DM, Pabst M, Gregos E, Plumridge AM, et al. A comprehensive study on the microbicidal properties of stabilized and unstabilized chlorine and the relationships of other chemical and physical variables in public swimming pools; a report of a study carried out in Pinellas County. [Online]. 1994 Nov 1. Available from: URL: [http://nspf.org/Documents/Research/Pinellas\\_Report\\_1994\\_PDF.pdf](http://nspf.org/Documents/Research/Pinellas_Report_1994_PDF.pdf)
15. Nemery B, Hoet PH, Nowak D. Indoor swimming pools, water chlorination and respiratory health. Eur Respir J 2002; 19(5): 790-3.
16. Uyan ZS, Carraro S, Piacentini G, Baraldi E. Swimming pool, respiratory health, and childhood asthma: should we change our beliefs? Pediatr Pulmonol 2009; 44(1): 31-37.
17. Kohlhammer Y, Doring A, Schafer T, Wich-

- mann HE, Heinrich J. Swimming pool attendance and hay fever rates later in life. *Allergy* 2006; 61(11): 1305-9.
18. Bernard A. Chlorination products: emerging links with allergic diseases. *Curr Med Chem* 2007; 14(16): 1771-82.
19. Al Khatib IA, Salah S. Bacteriological and chemical quality of swimming pools water in developing countries: a case study in the West Bank of Palestine. *Int J Environ Health Res* 2003; 13(1): 17-22.
20. Martins MT, Sato MIZ, Alves MN, Stoppe NC, Prado VM, Sanchez PS. Assessment of microbiological quality for swimming pools in South America. *Water Res* 1995; 29(10): 2417-20.
21. Ibarluzea J, Moreno B, Zigorraga C, Castilla T, Martinez M, Santamaría J. Determinants of the microbiological water quality of indoor swimming-pools in relation to disinfection. *Wat Res* 1998; 32(3): 865-71.
22. Standard and industrial research institute of Iran. Microbiological characteristics of swimming pool waters. Standard No. 9412. [Online]. Available from: URL: <http://isrc.nww.co.ir/>.

## An Investigation on Physical, Chemical and Microbial Quality of Isfahan Swimming Pool Waters Based on Standard Indicators

Mahnaz Nikaeen PhD<sup>1</sup>, Maryam Hatamzadeh<sup>2</sup>, Marzieh Vahid Dastjerdi MSc<sup>2</sup>, Akbar Hassanzadeh MSc<sup>3</sup>, Zahra Mosavi<sup>4</sup>, Mehdi Rafiei<sup>4</sup>

### Abstract

**Background:** Swimming is a recreational activity generally considered to be a healthy exercise. However, swimming pools may transmit a great number of infectious diseases, if not properly maintained, disinfected and monitored. The objective of the research was to investigate the water quality of Isfahan swimming pools and comprise the results with the standards.

**Methods:** Twenty-five of public swimming pools were surveyed. Water samples were examined for physiochemical parameters including temperature, turbidity, pH and free chlorine and also for heterotrophic plate count (HPC) bacteria, total and fecal coliforms, fecal streptococci, *Staphylococcus aureus* and *Pseudomonas aeruginosa*.

**Findings:** There was a poor compliance to the established standards for two important physiochemical parameters, including free chlorine and pH. Among the microbial indicators, total coliforms were the most frequent isolate, followed by HPC and fecal coliforms the next. The correlation analyses demonstrated the HPC and total coliforms bacteria populations increased with decrease in free chlorine. The correlation analyses also indicated that there was a positive relationship between total coliforms and all other microbiological parameters.

**Conclusion:** Complete compliance of the pools to the standards was fairly poor and only one of the pools was free of pollution by fecal coliforms and *P. aeruginosa*, two important microbial indicators, during the sampling period. It is also important to maintain the proper level of free chlorine and pH in the swimming pools to ensure safety of the water quality.

**Keywords:** Swimming pools, Water quality, Microbial indicators, Standard.

<sup>1</sup> Assistant Professor, Department of Environmental Health, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

<sup>2</sup> Department of Environmental Health, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

<sup>3</sup> Department of Statistics and Epidemiology, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

<sup>4</sup> Health Center of Isfahan Province, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

Corresponding Author: Mahnaz Nikaeen PhD, Email: nikaeen@hlth.mui.ac.ir