

بررسی مقایسه‌ای تغییرات همودینامیک درمان الکتریکی-تشنجی بیماران بعد از مصرف سیس آتراکوریم و سوکسینیل کولین

بهزاد ناظم رعایا^۱, داریوش مرادی^۲, علی صادقی وقفی^۲

مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: در بیمارانی که تحت درمان الکتریکی-تشنجی هستند، از سوکسینیل کولین استفاده می‌گردد و از سیس آتراکوریوم به صورت محدود در حد گزارش موردي در جهان استفاده می‌شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تغییرات همودینامیک در تجویز سوکسینیل کولین و سیس آتراکوریوم در درمان الکتریکی-تشنجی بود.

روش‌ها: مطالعه بر روی ۶۸ بیمار کاندیدای دریافت درمان الکتریکی-تشنجی انجام گردید. با استفاده از روش نمونه‌گیری آسان، بیماران به دو گروه ۳۴ نفری تقسیم شدند و دارو به صورت تصادفی ساده به هر بیمار اختصاص داده شد. برای مقایسه‌ی متغیرها، از آزمون‌های t Independent و χ^2 استفاده گردید.

یافته‌ها: بین میانگین مدت زمان تشنج، زمان برگشت تنفس خودبه‌خودی از زمان قطع تشنج، مدت زمان پایان تشنج تا هوشیاری کامل و زمان اقامت در ریکاوری، در دو گروه اختلاف معنی داری وجود داشت ($P < 0.05$): به طوری که متوسط مدت زمان تشنج در سیس آتراکوریوم ($8/16 \pm 8/0.2$ ثانیه) بیشتر از سوکسینیل کولین ($5/23 \pm 5/87$ ثانیه) بود، اما زمان برگشت تنفس خودبه‌خودی، زمان تشنج تا هوشیاری کامل و زمان اقامت در ریکاوری، در سوکسینیل کولین بیشتر از سیس آتراکوریوم بود.

نتیجه‌گیری: سیس آتراکوریوم، از نظر مدت اثر، متوسط می‌باشد. استفاده از دم آن در مقایسه با سوکسینیل کولین، متوسط مدت زمان برگشت تنفس خودبه‌خودی کوتاه‌تری دارد. همچنین، بروز عوارض در سیس آتراکوریوم نسبت به سوکسینیل کولین، بسیار کمتر است و در درمان الکتریکی-تشنجی، جایگزین مناسب‌تری نسبت به سوکسینیل کولین می‌باشد.

واژگان کلیدی: درمان الکتریکی-تشنجی، سوکسینیل کولین، سیس آتراکوریوم

ارجاع: ناظم رعایا بهزاد، مرادی داریوش، صادقی وقفی علی. بررسی مقایسه‌ای تغییرات همودینامیک درمان الکتریکی-تشنجی بیماران بعد از مصرف سیس آتراکوریم و سوکسینیل کولین. مجله دانشکده پزشکی اصفهان ۱۳۹۵؛ ۳۴(۳۹۵): ۹۷۰-۹۶۳.

مقدمه

الکتروشوک درمانی، عبارت از تحریک الکتریکی برنامه‌ریزی شده‌ی سیستم عصبی مرکزی برای آغاز فعالیت تشنجی است. این شوک الکتریکی، موجب فعالیت تونیک به مدت چند ثانیه و سپس فعالیت کلونیک از چند ثانیه تا بیش از یک دققه می‌شود (۱-۲). امروزه، الکتروشوک درمانی، یکی از روش‌های رایج در درمان انسواع بیماری‌های روانی مثل افسردگی شدید، اسکیزوفرنی حاد، مانی حاد، کاتاتونی و همچنین، به عنوان درمان انتخابی در بیمارانی است که به یک پاسخ سریع درمانی نیاز دارند (۳-۴). الکتروشوک درمانی، به علت استفاده از جریان برق و ایجاد تشنج، ترس آور است (۵). در الکتروشوک درمانی، جهت کاستن از انقباضات عضلانی و جلوگیری

از در رفتگی مفاصل و شکستگی‌های احتمالی، بیمار بیهوش می‌شود و داروی شل کننده‌ی عضلانی به وی تزریق می‌گردد. به طور معمول، از یک داروی القا کننده‌ی بیهوشی و به دنبال آن از یک داروی شل کننده استفاده می‌شود (۶).

shell کننده‌های عضلانی به انواع دی‌لاریزان و غیر دی‌لاریزان تقسیم می‌شوند. مکانیسم اثر، متابولیسم و عوارض این دو گروه عوامل مهمی در انتخاب این داروها برای دریافت الکتروشوک درمانی می‌باشد (۷). سوکسینیل کولین، داروی انتخابی به عنوان شل کننده عضلانی در الکتروشوک درمانی است (۸). سوکسینیل کولین، کوتاه‌اثر می‌باشد (۱) و موجب آزاد شدن مقادیر زیادی پتانسیم از عضلات اسکلتی در بیمارانی می‌شود که دچار سوختگی (۹)، ترومای عضلانی

- ۱- استادیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 - ۲- دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی و کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- نویسنده‌ی مسؤول: بهزاد ناظم رعایا

Email: behzad_nazem@med.mui.ac.ir

(شامل پسران تا سن ۱۸ سالگی و دختران تا سن ۲۵ سالگی) مراجعه کننده به بخش روانپزشکی کودکان بودند.

معیارهای ورود به مطالعه شامل کلیه بیماران بستری در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سینی زیر ۲۵ سال با ASA (American Society of Anesthesiologists) (درجه I و کاندیدای دریافت الکتروشوک درمانی بودند. همچنین، به الكل و مواد مخدر اعتیاد نداشتند. سابقه قلبی تشنج یا صرع و نیز آرژی شدید نداشتند. معیارهای خروج از مطالعه شامل افرادی بود که تشنج بیشتر از ۹۰ ثانیه و زیر ۲۰ ثانیه داشتند و افرادی که نیاز به ایتوپاپیون داشتند. نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری آسان انتخاب و تخصیص داروها به صورت تصادفی ساده انجام گرفت.

آنالیز اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ (version 22, SPSS Inc., Chicago, IL) و آزمون‌های Independent t و χ^2 انجام شد. همچنین به منظور آنالیز تکرار داده‌ها، از روش آماری Repeated measures ANOVA استفاده شد.

روش اجرا به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور بود. از دو داروی سیس آتراکوریوم و سوکسینیل کولین، به عنوان شل کننده در این مطالعه استفاده گردید. ۶۸ بیمار کاندیدای الکتروشوک درمانی مراجعه کننده به بخش روانپزشکی بیمارستان الزهرا (س) به صورت نمونه‌گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی ساده به دو گروه مساوی ۳۴ نفری تقسیم شدند. فرایند آماده‌سازی داروها بدین صورت بود که ۱ سی سی سوکسینیل کولین (معادل ۵۰ میلی‌گرم دارو) با مقدار ۴ سی سی آب مقطر به حجم ۵ سی سی رسانده شد و نیز مقدار ۲/۵ سی سی از سیس آتراکوریوم (هر سی سی معادل ۲ میلی‌گرم) نیز با مقدار ۲/۵ سی سی آب مقطر به حجم ۵ سی سی رسانده می‌شد و روی آن‌ها با حرروف A یا B کدگذاری می‌گردید؛ به نحوی که تنها کسی که داروها را آماده می‌کرد، از محتوای دارو اطلاع داشته باشد.

پس از اخذ رضایت آگاهانه از بیماران و اتصال دستگاه‌هایی از قبیل نوار قلب، پالس‌اکسیمتری و فشارسنج به بیمار و تزریق داروی بیهودش کننده، فرد تزریق کننده‌ی دارو، به ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بیمار ۰/۵ سی سی از یکی از داروهای کد A یا B به بیمار تزریق می‌شد. تجویز متواالی داروهای A و B برای بیماران در هر بار دریافت شوک، به صورتی بود که در انتها کار یکی از گروه‌های ۳۴ نفری داروی کد A و گروه دیگر داروی کد B را دریافت کرده بودند. میزان فشار خون سیستول-دیاستول، تعداد ضربان قلب و SaO_2 در هر بیمار قبل از تزریق دارو، حین تشنج اندازه‌گیری و ثبت می‌شد و پس از تمام شوک، بیمار وارد مرحله‌ی ریکاوری می‌گردید. میزان فشار خون سیستول-دیاستول، تعداد ضربان قلب و SaO_2 در دقایق ۱، ۵ و ۱۰ طی ریکاوری تعیین و ثبت می‌گردید.

(۱۰)، ترومای سیستم عصبی مرکزی (۱۱)، آسیب طباب نخاعی (۱۲-۱۳)، آسیب اعصاب محیطی (۱۴) و تغییرات عضلانی به علت عدم فعالیت (۱۵-۱۶) می‌شود.

افزایش در سطح پتانسیم، می‌تواند موجب مشکلاتی در این بیماران از جمله آریتمی بطنی و ارست قلبی شود. وقتی از سوکسینیل کولین استفاده می‌شود، فرایند دیپلاریزاسیون موجب افزایش در سطح پتانسیم می‌گردد. به طور معمول، این افزایش در حد ۱-۲ میلی اکی‌والان است، اما گزارش‌هایی نیز مبنی بر افزایش بیش از ۴ میلی اکی‌والان در سطح پتانسیم در برخی از بیمارانی که دچار بیماری عصبی-عضلانی غیر تروماتیک شدند، وجود دارد (۱۷) که ممکن است باعث آریتمی و کلپس قلبی-عروقی شود (۱۸). استفاده از سوکسینیل کولین در مواردی مثل کمبود آنزیم پسودوکولین استراز، استفاده از داروهای مولد مهار کننده‌ی کولین استراز و بیماری‌های عصبی-عضلانی شدید، می‌تواند خطر الکتروشوک درمانی را افزایش دهد (۱۹). سیس آتراکوریوم، ایزومر راست‌گردن آتراکوریوم است (۲۰). سیس آتراکوریوم و آتراکوریوم، هر دو جزء غیر دیپلاریزان می‌باشند. سیس آتراکوریوم، کمتر موجب آزادسازی هیستامین می‌شود، اما آزادسازی هیستامین عارضه‌ی اصلی آتراکوریوم می‌باشد (۲۱-۲۲).

سیس آتراکوریوم مکرر در بیهوشی در طول جراحی ترمیم بیماری‌های قلبی مادرزادی استفاده می‌شود (۲۳-۲۴). این دارو، به خودی خود در خون دستخوش تخریب به وسیله‌ی دفع هافمن به لادنوزین می‌شود و سپس به تعدادی متابولیت کوئنزوگه متابولیزه می‌گردد (۲۵-۲۷).

بنابراین، متابولیسم سیس آتراکوریوم، اغلب در پلاسما و بافت‌ها اتفاق می‌افتد. اگر چه دفع هافمن مکانیسم اصلی برای پاکسازی سیس آتراکوریوم در بدن است، اما پلاسماستراز، به وسیله‌ی هیدرولیز نیز نقش دارد (۲۸). استفاده از داروی مناسبی که از یک طرف عوارض زیاد سوکسینیل کولین را نداشت و از جهتی انتظار ما را در خصوص شل کننده برای درمان الکتریکی-تشنجی برآورده نماید ما را بر آن داشت که داروی سیس آتراکوریم را انتخاب نماییم. هدف نهایی از انجام مطالعه‌ی حاضر این بود که اگر چه سیس آتراکوریم از نظر مدت اثر جزء داروهای با اثر متوسط است، اما با استفاده از دز (۵۰ میکروگرم) ریکاوری بیمار خیلی طولانی تر از سوکسینیل کولین نیست و عوارض آن را ندارد.

روش‌ها

این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی شده بدون گروه شاهد بود. این مطالعه، در سال‌های ۱۳۹۴-۹۵ در مرکز آموزشی-درمانی الزهرا (س) اصفهان انجام گرفت. جامعه‌ی هدف بیماران

بیماران مرد بود، فراوانی تعداد موارد ابتلا به بیماری اختلال دو قطبی نیز در هر دو گروه نسبت به انواع دیگر بیماری‌های تحت بررسی بیشتر بود (در گروه سیس آتراکوریوم ۵۲/۹ و در گروه سوکسینیل کولین ۴۵/۵ درصد).

میانگین فشار خون سیستول بیماران در هر دو گروه در زمان‌های مختلف اندازه‌گیری شد. برای بررسی وجود اختلاف بین میانگین دو گروه در هر زمان، از آزمون t با در نظر گرفتن سطح معنی‌داری $0/050$ استفاده شد. تنها در دقیقه‌ی پنجم بعد از اتمام شوک، اختلاف معنی‌داری میان میانگین دو گروه وجود داشت ($P < 0/050$)؛ به طوری که متوسط فشار خون سیستول در سوکسینیل کولین بالاتر از سیس آتراکوریوم بود. در سایر زمان‌های تحت بررسی، هیچ اختلاف معنی‌داری بین میانگین دو گروه وجود نداشت ($P > 0/050$).

میانگین فشار خون دیاستول بیماران در هر دو گروه در زمان‌های مختلف اندازه‌گیری شد. برای بررسی وجود اختلاف بین میانگین دو گروه در هر زمان از آزمون t با در نظر گرفتن سطح معنی‌داری $0/050$ استفاده شد. تنها در دقیقه‌ی دهم بعد از اتمام شوک، اختلاف معنی‌داری بین میانگین دو گروه وجود داشت ($P < 0/050$)؛ به طوری که متوسط فشار خون دیاستول در گروه سوکسینیل کولین بالاتر از سیس آتراکوریوم بود، در سایر زمان‌های تحت بررسی هیچ اختلاف معنی‌داری بین میانگین دو گروه وجود نداشت ($P > 0/050$).

همچنین، میزان بروز عوارض تهوع، استفراغ و لارنگوسپاسم در بیماران پس از اتمام تشنج ثبت می‌شد. مدت زمان برگشت تشفس خود به خودی نیز از زمان قطع تشنج در بیماران ثبت می‌گردید. مدت زمان اقامت در ریکاوری در هر بیمار ثبت می‌شد. در انتهای، پس از ثبت اطلاعات مورد نظر، کد داروهای گروه A و B که به ترتیب مربوط به سیس آتراکوریوم و سوکسینیل کولین بود، رمزگشایی و نتایج تفسیر گردید.

یافته‌ها

در این مطالعه، از میان ۶۷ بیمار مراجعه کننده به بخش روان‌پژوهشکی کودکان و نوجوانان به صورت تصادفی شده، ۳۴ نفر به گروه سیس آتراکوریوم و ۳۳ نفر به سوکسینیل کولین تخصیص داده شدند. سن بیماران تحت بررسی در گروه سیس آتراکوریوم، $15/50 \pm 3/126$ و در گروه سوکسینیل کولین، $3/499 \pm 16/390$ سال، وزن بیماران در گروه سیس آتراکوریوم، $61/210 \pm 16/394$ و در گروه سوکسینیل کولین، $12/673 \pm 7/776$ کیلوگرم بود. توزیع فراوانی متغیرهای جنسیت و نوع بیماری به تفکیک دو گروه در جدول ۱ آمده است.

همان‌طور که در جدول ۱ مشاهده می‌شود، توزیع متغیر جنسیت و نوع بیماری در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت ($P > 0/050$). همچنین، در هر دو گروه، فراوانی تعداد بیماران زن بیشتر از تعداد

جدول ۱. توزیع فراوانی متغیرهای جنسیت و نوع بیماری به تفکیک دو گروه درمانی تحت مطالعه

مقدار P	جمع	گروه [تعداد (درصد)]		تقسیم‌بندی	متغیر
		سوکسینیل کولین	سیس آتراکوریوم		
۰/۱۵۹	۴۱ (۶۱/۲)	۲۳ (۵۹/۷)	۱۸ (۵۲/۹)	زن	جنس
	۲۶ (۳۸/۸)	۱۰ (۳۰/۳)	۱۶ (۴۱/۷)	مرد	
۶۷ (۱۰۰)	۳۳ (۱۰۰)	۳۴ (۱۰۰)		جمع	
۳ (۴/۵)	۲ (۶/۱)	۱ (۲/۹)		بیش فعالی	نوع بیماری
۶ (۹/۰)	۲ (۶/۱)	۴ (۱۱/۸)		اختلال وسوسی - جبری	
۳۳ (۴۹/۳)	۱۵ (۴۵/۵)	۱۸ (۵۲/۹)		اختلال دو قطبی	
۷ (۱۰/۴)	۳ (۹/۱)	۴ (۱۱/۸)		سایکوز	
۳ (۴/۵)	۳ (۹/۱)	۰ (۰)		افسردگی مازور	
۴ (۶/۰)	۲ (۶/۱)	۲ (۵/۹)		اختلال سلوک	
۴ (۶/۰)	۲ (۶/۱)	۲ (۵/۹)		عقب‌ماندگی ذهنی	
۳ (۴/۵)	۱ (۳/۰)	۲ (۵/۹)		اسکیزووفرنی	
۱ (۱/۵)	۱ (۳/۰)	۰ (۰)		سندرم نوروپلیتیک بدخیم	
۲ (۳/۰)	۱ (۳/۰)	۱ (۲/۹)		افسردگی	
۱ (۱/۵)	۱ (۳/۰)	۰ (۰)		بی‌اشتهاای عصبی	
۶۷ (۱۰۰)	۳۳ (۱۰۰)	۳۴ (۱۰۰)		جمع	

جدول ۲. توزیع فراوانی متغیرهای جنسیت و نوع بیماری به تفکیک دو گروه درمانی تحت مطالعه

متغیر	گروه	تعداد ضربان قلب	آزمون t		میانگین ± انحراف معیار
			P	مقدار	
قبل از تزریق دارو	سیس آتراکوریوم	۷۹/۸۵ ± ۱۰/۷۴	۳/۱۶۷	۰/۰۹۹	۷۹/۸۵ ± ۱۰/۷۴
	سوکسینیل کولین				۷۵/۲۱ ± ۱۰/۳۸
دقیقه‌ی یکم پس از شوک	سیس آتراکوریوم	۱۰۲/۰۵ ± ۱۷/۳۰	۱/۵۸۴	۰/۹۳۷	۱۰۲/۰۵ ± ۱۷/۳۰
	سوکسینیل کولین				۹۵/۵۱ ± ۱۶/۳۸
دقیقه‌ی پنجم پس از شوک	سیس آتراکوریوم	۱۱۹/۷۳ ± ۲۰/۹۰	۱/۷۹۲	۰/۲۰۷	۱۱۹/۷۳ ± ۲۰/۹۰
	سوکسینیل کولین				۱۲۹/۶۹ ± ۲۴/۴۵
دقیقه‌ی دهم پس از شوک	سیس آتراکوریوم	۱۰۰/۷۳ ± ۱۴/۹۸	۱/۱۶۵	۰/۲۴۸	۱۰۰/۷۳ ± ۱۴/۹۸
	سوکسینیل کولین				۱۰۵/۲۴ ± ۱۶/۶۴

شد. پیش از تزریق دارو، اختلاف معنی‌داری بین میانگین دو گروه تحت درمان وجود نداشت ($P > 0.050$). در سایر زمان‌های تحت بررسی، اختلاف معنی‌داری بین میانگین درصد اکسیژن خون دو گروه وجود داشت ($P < 0.050$)؛ به طوری که متوسط درصد اکسیژن خون در سیس آتراکوریوم در هر سه زمان پیش‌گفته، بالاتر از سوکسینیل کولین بود. بر اساس جدول ۳ با در نظر گرفتن سطح معنی‌داری ($P < 0.050$ ، اختلاف معنی‌داری بین میانگین مدت زمان تشنج، زمان برگشت تنفس خودبه‌خودی از زمان قطع تشنج، مدت زمان پایان تشنج تا هوشیاری کامل و زمان اقامت ریکاوری در دو گروه وجود داشت ($P < 0.050$)؛ به طوری که متوسط مدت زمان تشنج در سیس آتراکوریوم، بیشتر از سوکسینیل کولین بود و زمان برگشت تنفس خودبه‌خودی از زمان قطع تشنج (دقیقه) بیشتر از سیس آتراکوریوم بود. متوسط مدت زمان پایان تشنج تا رسیدن به پاسخ کلامی در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت ($P > 0.050$).

میانگین فشار خون متوسط شریانی بیماران در هر دو گروه در زمان‌های مختلف اندازه‌گیری شد. برای بررسی بین میانگین دو گروه در هر زمان، از آزمون t با در نظر گرفتن سطح معنی‌داری ($P < 0.050$) استفاده شد. تنها در دقیقه‌ی پنجم بعد از اتمام شوک، اختلاف معنی‌داری بین میانگین دو گروه تحت درمان وجود داشت ($P < 0.050$)؛ به طوری که متوسط فشار خون شریانی در سوکسینیل کولین بالاتر از سیس آتراکوریوم بود و در سایر زمان‌های تحت بررسی، هیچ اختلاف معنی‌داری بین میانگین دو گروه وجود نداشت ($P > 0.050$).

در جدول ۲، میانگین تعداد ضربان قلب بیماران در هر دو گروه با توجه به زمان‌های مختلف اندازه‌گیری آمده است. اختلاف معنی‌داری بین میانگین دو گروه وجود نداشت.

میانگین درصد اکسیژن خون بیماران در هر دو گروه در زمان‌های مختلف اندازه‌گیری شد. برای بررسی وجود اختلاف بین میانگین دو گروه در هر زمان، از آزمون t با در نظر گرفتن سطح معنی‌داری ($P < 0.050$) استفاده

جدول ۳. مقایسه‌ی میانگین زمان‌های مورد بررسی در دو گروه درمانی

متغیر	گروه	میانگین زمان	آزمون t		P
			مقدار	مقدار	
مدت زمان تشنج (ثانیه)	سیس آتراکوریوم	۳۸/۰۲	< 0/001	۴/۸۵۰	۳۸/۰۲
	سوکسینیل کولین				۲۹/۸۷
مدت زمان پایان تشنج تا رسیدن به پاسخ کلامی (دقیقه)	سیس آتراکوریوم	۱۲/۷۹	0/۸۰۷	0/۲۴۵	۱۲/۷۹
	سوکسینیل کولین				۱۲/۳۹
زمان برگشت تنفس خودبه‌خودی از زمان قطع تشنج (دقیقه)	سیس آتراکوریوم	۲۸/۰۵	0/۰۴۳	4/۲۶۲	۲۸/۰۵
	سوکسینیل کولین				۴۷/۱۲
مدت زمان پایان تشنج تا هوشیاری کامل (دقیقه)	سیس آتراکوریوم	۱۹/۵۰	< 0/001	3/۶۱۲	۱۹/۵۰
	سوکسینیل کولین				۲۴/۸۱
زمان اقامت ریکاوری (دقیقه)	سیس آتراکوریوم	۳۳/۷۶	0/۰۰۱	5/۵۱۱	۳۳/۷۶
	سوکسینیل کولین				۴۲/۷۸

جدول ۴. مقایسه فراوانی عوارض پس از عمل در دو گروه مورد مطالعه

متغیر	سیس آتراکوریوم	سوکسینیل کولین	تعداد (درصد)	فراوانی	آزمون t	P	مقدار	مقدار	آزمون t
سردرد	سیس آتراکوریوم	سوکسینیل کولین	۳ (۸/۸۲)	۱۰ (۳۰/۳)	۰/۰۲۶	۹۱/۴۰۰			
	سوکسینیل کولین	سیس آتراکوریوم	۲ (۵/۸۸)	۴ (۱۲/۱۲)	۰/۳۹۱	۰/۷۹۹			
سرفه	سیس آتراکوریوم	سوکسینیل کولین	۰ (۰)	۲ (۶/۰)	۰/۱۴۵	۲/۱۲۴			
	سوکسینیل کولین	سیس آتراکوریوم	۲ (۵/۸۸)	۸ (۲۳/۵۲)	۰/۰۳۵	۴/۴۴۶			
نهوع	سیس آتراکوریوم	سوکسینیل کولین	۱ (۲/۹۴)	۲۰ (۶۰/۶۰)	<۰/۰۰۱	۲۵/۸۸۷			
	سوکسینیل کولین	سیس آتراکوریوم							درد عضلانی

می‌گردد که بیانگر آن است که در افسردگی، به طور قابل توجهی فعالیت پارامپاتیک کاهش می‌یابد (۳۰).

میانگین درصد اکسیژن خون بیماران در هر دو گروه نشان داد که پیش از تزریق دارو، اختلاف معنی داری بین میانگین دو گروه وجود نداشت. در سایر زمان‌ها، اختلاف معنی داری بین میانگین درصد اکسیژن خون دو گروه وجود داشت؛ به طوری که متوسط درصد اکسیژن خون در گروه سیس آتراکوریوم در هر سه زمان پیش گفته، بالاتر از سوکسینیل کولین بود. به نظر می‌رسد این نتیجه، می‌تواند وابسته به بالا رفتمن مصرف اکسیژن در دو زمان باشد یکی ماهیچه‌له‌زره (Fasciculation) ناشی از سوکسینیل کولین چرا که در گروهی که سوکسینیل کولین تجویز شده است، این کاهش دیده می‌شود و دیگری در مرحله‌ی تشنج که مصرف اکسیژن بالا می‌رود. درست است که در حین تشنج جریان اکسیژن توسط ماسک اکسیژن برای بیمار برقرار است، اما در این مرحله، حمایت تنفسی با آمبو انجام نمی‌شود و تنها پس از خاتمه‌ی تشنج امکان پذیر است. نظیر این حالت در لرز پس از بیهوشی دیده می‌شود که مصرف اکسیژن شش برابر (۶۰۰ درصد) افزایش دارد (۱).

متوسط مدت زمان تشنج در گروه سیس آتراکوریوم بیشتر از سوکسینیل کولین بود. با توجه به این که مدت ایجاد تشنج در بیماران اثر درمانی مستقیم در این بیماران دارد و نباید کمتر از ۲۰ ثانیه باشد، از این رو، هر دو دارو به نظر داروی خوبی هستند؛ با این تفاوت که در صورت به کارگیری داروهای آرام‌بخشی همراه با رژیم دارویی جهت درمان الکتریکی - تشنجی برای پذیرش بهتر درمان از سوی بیمار یا کاهش عوارض ناخواسته‌ی داروهای بیهوشی، می‌تواند طول مدت تشنج را کوتاه کند و اگر مدت زمان تشنج به کمتر از ۲۰ ثانیه برساند، اثر درمانی از بین می‌رود. به عنوان مثال، اگر از میدازولام به عنوان

در جدول ۴، مشاهده می‌شود که با در نظر گرفتن سطح معنی داری ۰/۰۵۰، فراوانی بروز عوارض سردرد، تهوع و درد عضلانی در دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت ($P < 0/050$)؛ به طوری که فراوانی بروز سردرد، تهوع و درد عضلانی در سوکسینیل کولین بیشتر از سیس آتراکوریوم بود. فراوانی تعداد دفعات بروز دو عارضه‌ی لارنگواسپاسم و سرفه در هر دو گروه تفاوت معنی داری نداشت ($P > 0/050$).

با توجه به جدول ۴، شایع‌ترین عارضه در سیس آتراکوریوم، سردرد با تعداد بروز ۳ نفر (۸/۸۲ درصد) بود، در حالی که شایع‌ترین عارضه در سوکسینیل کولین، درد عضلانی با تعداد بروز ۲۰ نفر (۶۰/۶۰ درصد) بود.

بحث

۵/۸ درصد کل افراد، به اختلال دو قطبی و افسردگی مبتلا بودند؛ این دو اختلال، شایع‌ترین اختلالات در بین بیماران بودند و در آمارهای جهانی نیز بالاترین شیوع (۱۶-۲۰ درصد) برای این دو بیماری گزارش شده است (۲۹).

اختلاف معنی داری بین میانگین تعداد ضربان قلب در دو گروه وجود نداشت، اما تاکی کاردنی به طور تقریبی وجود داشت. در مطالعه‌ی Bozkurt درمان الکتروشوک در بیماران افسرده، پیشنهاد شده است که افسردگی ممکن است با کاهش فعالیت پارامپاتیک همراه باشد. ECT باعث افزایش نسیبی واگ (پارامپاتیک) می‌شود. در نتیجه، فعالیت قلبی افزایش می‌یابد. تغییر در اثرات ناشی از چرخه‌ی تنفسی در آریتمی سینوسی - تنفسی، نشانه‌ای از فعل شدن پارامپاتیک در قلب می‌باشد و تغییرات ضربان قلب، یکی از این نشانه‌ها به عنوان سیستم نمره‌دهی (Hamilton depression rating scale scores) Hamilton محسوب

(سوکسینیل کولین)، در مقابل گروه کتابمین (تحت درمان کتریکی - تشنجی نبودند) نیز بیشتر بوده است (۲۹). همچنین، در مطالعه‌ی حاضر بین درصد فراوانی بروز عوارض سردرد، تهوع و درد عضلانی در دو گروه، تفاوت معنی‌داری وجود داشت؛ به طوری که فراوانی بروز سردرد، تهوع و درد عضلانی در سوکسینیل کولین بیشتر از سیس آتراکوریوم بوده است. شایع ترین عارضه در گروه سیس آتراکوریوم، سردرد با تعداد بروز ۳ نفر (۸/۸۲ درصد) و در گروه سوکسینیل کولین، درد عضلانی با تعداد بروز ۲۰ نفر (۶۰/۶۰ درصد) بود. با توجه به فراوانی‌های مشاهده شده، می‌توان تنبیه گرفت تعداد موارد بروز عوارض پس از عمل در سیس آتراکوریوم بسیار کم بوده است.

با وجود این که سیس آتراکوریوم به عنوان شل کننده عضلانی از نظر مدت اثر متوسط می‌باشد، استفاده از دز کم (۵۰ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم) آن در مقایسه با سوکسینیل کولین متوسط مدت زمان برگشت تنفس خودبه‌خودی کوتاه‌تر و متوسط مدت زمان تشنج طولانی‌تری دارد و بروز عوارض در گروه سیس آتراکوریوم نسبت به سوکسینیل کولین بسیار کمتر بوده است. از این رو، به نظر می‌رسد سیس آتراکوریوم در رژیم دارویی درمان کتریکی - تشنجی، جایگزین مناسب‌تری نسبت به سوکسینیل کولین باشد.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل پایان‌نامه‌ی دوره‌ی دکتری حرفه‌ای پزشکی عمومی به شماره‌ی ۳۹۴۷۵۳ می‌باشد. نویسنده‌گان این مقاله از حمایت‌های بی‌دریغ مادی و معنوی حوزه‌ی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاون پژوهشی گروه بیهوشی آقای دکتر عظیم هنرمند و کارکنان پخت روان‌پزشکی کودکان و نوجوانان به خصوص سرکار خانم اعظم مژروعی سبدانی تشکر و قدردانی می‌نمایند.

References

- Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Cohen NH. Miller's Anesthesia. 8th ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders; 2015.
- Holden C. A guarded endorsement for shock therapy. Science 1985; 228(4707): 1510-1.
- Rasmussen KG, Sampson SM, Rummans TA. Electroconvulsive therapy and newer modalities for the treatment of medication-refractory mental illness. Mayo Clin Proc 2002; 77(6): 552-6.
- Potter WZ, Rudorfer MV. Electroconvulsive therapy-a modern medical procedure. N Engl J Med 1993; 328(12): 882-3.
- Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan & Sadock's Comprehensive textbook of psychiatry. 7th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2000. p. 489-91.
- Ding Z, White PF. Anesthesia for electroconvulsive therapy. Anesth Analg. 2002; 94(5): 1351-64.
- Hicks FG. ECT Modified by Atracurium. Convuls Ther 1987; 3(1): 54-9.
- Holmberg G, Thesleff S. Succinyl-choline-iodide as a muscular relaxant in electroshock therapy. Am J Psychiatry 1952; 108(11): 842-6.
- Tolmie JD, Joyce TH, Mitchell GD. Succinylcholine danger in the burned patient. Anesthesiology 1967; 28(2): 467-70.
- Mazze RI, Escue HM, Houston JB. Hyperkalemia and cardiovascular collapse following administration of succinylcholine to the traumatized patient. Anesthesiology 1969; 31(6): 540-7.
- Stevenson PH, Birch AA. Succinylcholine-induced hyperkalemia in a patient with a closed head injury. Anesthesiology 1979; 51(1): 89-90.
- Stone WA, Beach TP, Hamelberg W. Succinylcholine-

داروی آرام‌بخشی همراه سوکسینیل کولین استفاده شود، ممکن است طول مدت تشنج را به اندازه‌ای کوتاه کند که تشنج ایجاد شده مؤثر نباشد، اما استفاده از میدازولام همراه سیس آتراکوریوم، نمی‌تواند طول مدت تشنج را به اندازه‌ای کوتاه کند از ایجاد تشنج مؤثر جلوگیری کند. از طرفی، افزایش طول مدت تشنج بیش از ۶۰ ثانیه، علاوه بر اثر درمانی کتریکی - تشنجی، اثرات مضاری همچون ایجاد کانون تشنجی ایجاد می‌نماید.

مدت زمان برگشت تنفس خودبه‌خودی، مدت زمان قطع تنفس تا هوشیاری کامل و زمان اقامت در ریکاوری در گروه سوکسینیل کولین بیشتر از سیس آتراکوریوم بود. با توجه به مدت زمان برگشت تنفس خودبه‌خودی که در سوکسینیل کولین به طور معنی‌داری طولانی‌تر بود و این امر، با برگشت اثر شل کننده‌ی آن در مقایسه با داروهای دیگر در اعمال جراحی مغایرت دارد؛ بروز این وضعیت، می‌تواند مربوط به میزان مصرف داروهای شل کننده در درمان کتریکی - تشنجی باشد که نصف از انتوپاسیون است. حداقل مدت اثر شل کننده‌ی در انتوپاسیون در زمان القای بیهوشی (Induction)، همراه با داروهای بیهوشی و مخدّرها در ادامه‌ی بیهوشی (Maintenance) (برای سوکسینیل کولین ۳/۷-۶/۷ دقیقه و برای سیس آتراکوریوم ۱۱/۳-۱۱/۶ دقیقه بود) (۱). در مقابل، در این مطالعه بیشترین مدت اثر شل کننده‌ی درمان کتریکی - تشنجی با دز کم برای سوکسینیل کولین ۱۲/۴-۱۲/۴ ثانیه و برای سیس آتراکوریوم ۰۵/۲۸ ثانیه بود که این کاهش زمان دیده شده، هم‌جهت با کاهش از داروهای پیش‌گفته بوده است.

زمان اقامت در ریکاوری در گروه سوکسینیل کولین ۹ دقیقه بیشتر از سیس آتراکوریوم بود که این مدت، قابل توجه به نظر می‌رسد. در مطالعه‌ی خیرآبادی و همکاران، فراوانی بروز عوارض سردرد و درد عضلانی در گروهی که تحت درمان کتریکی - تشنجی بودند

- danger in the spinal-cord-injured patient. *Anesthesiology* 1970; 32(2): 168-9.
13. Tobey RE. Paraplegia, succinylcholine and cardiac arrest. *Anesthesiology* 1970; 32(4): 359-64.
 14. Tobey RE, Jacobsen PM, Kahle CT, Clubb RJ, Dean MA. The serum potassium response to muscle relaxants in neural injury. *Anesthesiology* 1972; 37(3): 332-7.
 15. Gronert GA, Theye RA. Effect of succinylcholine on skeletal muscle with immobilization atrophy. *Anesthesiology* 1974; 40(3): 268-71.
 16. Sarubin J, Gebert E. Serum potassium rise following depolarizing muscle relaxants in immobilized patients (author's transl). *Anaesthetist* 1981; 30(5): 246-50.
 17. Consensus conference. Electroconvulsive therapy. *JAMA* 1985; 254(15): 2103-8.
 18. Thomas ET. Circulatory collapse following succinylcholine: report of a case. *Anesth Analg* 1969; 48(3): 333-7.
 19. Marco LA, Randels PM. Succinylcholine drug interactions during electroconvulsive therapy. *Biol Psychiatry* 1979; 14(2): 433-45.
 20. Kisor DF, Schmitt VD. Clinical pharmacokinetics of cisatracurium besilate. *Clin Pharmacokinet* 1999; 36(1): 27-40.
 21. Bryson HM, Faulds D. Cisatracurium besilate. A review of its pharmacology and clinical potential in anaesthetic practice. *Drugs* 1997; 53(5): 848-66.
 22. Belmont MR, Lien CA, Quesey S, Abou-Donia MM, Abalos A, Eppich L, et al. The clinical neuromuscular pharmacology of 51W89 in patients receiving nitrous oxide/opioid/barbiturate anesthesia. *Anesthesiology* 1995; 82(5): 1139-45.
 23. Pinard AM, Donati F, Martineau R, Denault AY, Taillefer J, Carrier M. Magnesium potentiates neuromuscular blockade with cisatracurium during cardiac surgery. *Can J Anaesth* 2003; 50(2): 172-8.
 24. Mirinejad M, Azarfarin R, Asl AA. Cisatracurium in cardiac surgery-continuous infusion vs. bolus administration. *Middle East J Anaesthesiol* 2007; 19(3): 563-72.
 25. Dear GJ, Harrelson JC, Jones AE, Johnson TE, Pleasance S. Identification of urinary and biliary conjugated metabolites of the neuromuscular blocker 51W89 by liquid chromatography/mass spectrometry. *Rapid Commun Mass Spectrom* 1995; 9(14): 1457-64.
 26. Welch RM, Brown A, Ravitch J, Dahl R. The in vitro degradation of cisatracurium, the R, cis-R'-isomer of atracurium, in human and rat plasma. *Clin Pharmacol Ther* 1995; 58(2): 132-42.
 27. Weindlmayr-Goettel M, Kress HG, Hammerschmidt F, Nigrovic V. In vitro degradation of atracurium and cisatracurium at pH 7.4 and 37 degrees C depends on the composition of the incubating solutions. *Br J Anaesth* 1998; 81(3): 409-14.
 28. Kisor DF, Schmitt VD, Wargin WA, Lien CA, Ornstein E, Cook DR. Importance of the organ-independent elimination of cisatracurium. *Anesth Analg* 1996; 83(5): 1065-71.
 29. Kheirabadi G, Vafaei M, Attari A. Intravenous ketamine therapy vs. Electroconvulsive therapy in depressive cases. *J Isfahan Med Sch* 2012; 29(163): 1289-97. [In Persian].
 30. Bozkurt A, Barcin C, Isintas M, Ak M, Erdem M, Ozmenler KN. Changes in heart rate variability before and after ECT in the treatment of resistant major depressive disorder. *Isr J Psychiatry Relat Sci* 2013; 50(1): 40-6.

Comparison of Cisatracurium and Succinylcholine on Hemodynamic Changes during and after Electroconvulsive Therapy

Behzad Nazemroaya¹, Darioush Moradi-Farsani¹, Ali Sadeghi-Vaghfi²

Original Article

Abstract

Background: The succinylcholine as a muscle relaxant is used in patients undergoing electroconvulsive therapy; so far, cisatracurium has not been used routinely and any study has not been done on it. Only limited use of cisatracurium has been reported in the literature. The aim of this study was to compare the changes in heart rate and blood pressure induced by succinylcholine and cisatracurium in patients who are undergoing electroconvulsive therapy.

Methods: This clinical trial study was randomized double-blinded without controls. The study included 68 patients who were candidates for receiving electroconvulsive therapy. Using convenience sampling method, the patients were divided into two equal groups. Randomly, each group received one drugs (cisatracurium or succinylcholine). The collected data were analyzed using independent t and chi-square tests.

Findings: The mean duration of seizures, spontaneous respiration recovery time since the cessation of seizure, duration of seizure to full consciousness, residence time of recovery were significantly different between the two treatment groups ($P < 0.05$ for all). As, the mean duration of seizures was more in cisatracurium group (38.02 ± 8.16 s) compared to succinylcholine group (29.87 ± 5.23 s); but, spontaneous respiration recovery time since the cessation of seizure, duration of seizure to full consciousness, residence time of recovery more in succinylcholine group.

Conclusion: Cisatracurium is established as an intermediate-acting muscle relaxant with intermediate effect duration. Using low dose of cisatracurium, compared to succinylcholine, tends to shorter mean time to spontaneous respiration with much less complications after electroconvulsive therapy; it seems that cisatracurium can be a good alternative for succinylcholine in electric convulsive therapy.

Keywords: Electroconvulsive therapy, Cisatracurium, Succinylcholine

Citation: Nazemroaya B, Moradi-Farsani D, Sadeghi-Vaghfi A. Comparison of Cisatracurium and Succinylcholine on Hemodynamic Changes during and after Electroconvulsive Therapy. J Isfahan Med Sch 2016; 34(395): 963-70.

1- Assistant Professor, Department of Anesthesiology and Critical Care, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2- Student of Medicine, School of Medicine AND Students Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

Corresponding Author: Behzad Nazemroaya, Email: behzad_nazem@med.mui.ac.ir