

گزارش موردی: استئوکندروم استخوان اسکافوئید

دکتر محمد جاودان^{*}، دکتر مهدی مطیفی فرد^{*}، دکتر مهدی تیموری^{**}

^{*} استادیار گروه ارتوبدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

^{**} رزیدنت گروه ارتوبدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

تاریخ دریافت: ۸۸/۱/۱۵

تاریخ پذیرش: ۸۸/۵/۶

چکیده

بیماری با استئوکندروم استخوان اسکافوئید (exostosis) با درد مج دست و توده دردناک معرفی می‌شود. در این بیمار توده با نتیجه‌های عالی برداشته شد.

استئوکندروم، اگزوستوز، استخوان اسکافوئید

تعداد صفحات:

تعداد جداول:

تعداد نمودارها:

تعداد منابع:

آدرس نویسنده مسئول:

دکتر مهدی تیموری، رزیدنت گروه ارتوبدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
E-mail: dr.teimouri@yahoo.com

مقدمه

دورسورادیال مچ دست راست بود. هیچ گونه شرح حال قبلی از تروما در بیمار وجود نداشت. در معاینه‌ی بالینی، توode‌ی دردناک واضحی در Anatomical snuffbox دست راست وجود داشت. دامنه‌ی حرکتی هر دو مچ دست 40° اکستنسیون، 35° فلکسیون، 0° انحراف رادیال و 30° انحراف اولnar بود. فکلسیون مچ دست همراه با نیرو باعث افزایش درد بیمار می‌گردید. رادیوگرافی و سی‌تی اسکن یک بیرون زدگی استخوانی را در نمای دورسورادیال استخوان اسکافوئید نشان داد. هیچ کدام از دیگر استخوان‌های دست و مچ درگیر نبودند. هیچ گونه بررسی تکنیکی دیگری انجام نشد.



شکل ۱. رادیوگرافی و سی‌تی اسکن مچ دست بیمار

استئوکندروم یک تومور استخوانی شایع است؛ این تومور از پریوسست استخوان منشأ می‌گیرد و احتمال می‌رود بیشتر یک مالفورماتیون تکاملی باشد تا یک تومور استخوانی حقیقی (۱). این تومور در اثر استخوان سازی داخل غضروفی پیشرونده ایجاد شده، به طور معمول برخلاف تومورهای حقیقی رشدش پس از بلوغ اسکلتی متوقف می‌شود. امکان ایجاد آن در هر استخوانی وجود دارد ولی اغلب در متافیز استخوان‌های بلند نزدیک فیز ایجاد می‌شود. شایعترین محل این تومورها در دیستال استخوان فمور، پروگریمال تیبا و پروگریمال هومروس است (۲).

این تومور اغلب بدون علامت است ولی گاهی باعث ایجاد درد در اثر فشار بر روی عناصر مجاور می‌گردد. بیشتر به صورت منفرد دیده می‌شود و به طور معمول انواع متعدد آن ارثی می‌باشند. تغییر به بدخیمی به ندرت در آن دیده می‌شود و انسیدانس تغییر به بدخیمی برای بیماران مبتلا به استئوکندروم منفرد ۱٪ و برای نوع متعدد ۰.۵٪ تخمین زده شده است (۳).

برداشتن تومور به وسیله‌ی جراحی در صورت بروز علائم توصیه می‌شود. عود پس از برداشتن تومور نادر است و به خصوص در ضایعات بدون پایه دیده می‌شود و ناشی از برداشتن ناقص تومور می‌باشد (۴).

در این مقاله، موردی از استئوکندروم علامت‌دار استخوان اسکافوئید همراه با یک توode‌ی دردناک و تندر در سمت دورسورادیال مچ دست راست را گزارش می‌کنیم که این بیمار با برداشتن توode، با نتیجه عالی درمان شد.

گزارش مورد

بیمار خانمی ۶۲ ساله و راست دست با شرح حال ۶ ماهه از یک توode‌ی دردناک و تندر در سمت

استئوکندروم دو طرفه اسکافوئید در مقالات پیشین گزارش شده است (۹-۱۰). در ۳ گزارش از این موارد، بیماران در دهه اول زندگی و در دو گزارش دیگر، در دهه دوم زندگی بوده‌اند که نسبت به گزارش ما در سن پایین‌تری قرار داشته‌اند. توجیه خاصی برای سن بالای بیمار مورد مطالعه‌ی ما وجود ندارد.

در تمامی بیماران گزارش شده‌ی قبلی مانند مطالعه‌ی ما، سابقه‌ای از بیماری در افراد خانواده وجود نداشته و ریسک فاکتور مشخصی برای ایجاد استئوکندروم اسکافوئید بیان نشده است.

وجود برآمدگی استخوانی (اگزوستوز)، دامنه‌ی حرکت طبیعی اسکافوئید را در هنگام حرکت مچ دست محدود می‌کند و در نهایت منجر به پاره شدن لیگامان اسکافولونیت می‌شود (۷). در مطالعه‌ی ما این لیگامان دست نخورده بود.

درمان در تمام گزارش‌های پیشین En bloc resection بدون مبادرت به ترمیم فاصله (گپ) اسکافولونیت بوده است. در این بیمار ۶۲ ساله برداشتن توده با نتیجه‌ی عالی انجام شد.

اگرچه استئوکندروم اسکافوئید نادر می‌باشد ولی در بیمارانی که به علت درد و محاذویت حرکت مچ دست مراجعه می‌کنند بدون در نظر گرفتن سن بیمار، باید به عنوان یک تشخیص افتراقی مد نظر باشد.

در نتیجه‌ی افزایش درد و کاهش دامنه‌ی حرکتی، درمان جراحی پیشنهاد شد. بیمار تحت عمل برداشتن توده از طریق برش دورسال قرار گرفت. این تومور با غضروف پوشیده شده و لیگامان اسکافولونیت نیز دست نخورده بود. غضروف روی استخوان اسکافوئید، سر استخوان کاپیتیت و نیز رادیوس دچار فرسایش نشده بود. بررسی بافت‌شناسی استئوکندرومی با کلاه غضروفی را نشان داد.

درد به طور کامل ناپدید شد و بیمار بسیار راضی بود. او 75° اکستانسیون و 55° فلکسیون و 30° انحراف اولنارورادیال به دست آورد.

بحث

استئوکندروم یک برجستگی استخوانی پوشیده شده با یک کلاه غضروفی و یکی از تومورهای بسیار شایع سیستم اسکلتی است؛ این تومورها به طور معمول قبل از بلوغ اسکلتی دیده می‌شود (۲).

در این مقاله، یک مورد استئوکندروم استخوان بدون آسیب لیگامان اسکافولونیت با سن ۶۲ سال گزارش شده است.

استئوکندروم منفرد، در دست غیر معمول است و وقتی خود را نشان می‌دهد، اغلب انگشتان یا متاکارپ‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد (۴). تاکنون ۴ مورد استئوکندروم یک طرفه اسکافوئید (۵-۸) و ۲ مورد

References

1. Biermann JS. Common benign lesions of bone in children and adolescents. J Pediatr Orthop 2002; 22(2): 268-73.
2. Chin KR, Kharrazi FD, Miller BS, Mankin HJ, Gebhardt MC. Osteochondromas of the distal aspect of the tibia or fibula. Natural history and treatment. J Bone Joint Surg Am 2000; 82(9): 1269-78.
3. Siebenrock KA, Ganz R. Osteochondroma of the femoral neck. Clin Orthop Relat Res 2002; (394): 211-8.
4. Bottner F, Rodl R, Kordish I, Winklemann W, Gosheger G, Lindner N. Surgical treatment of

- symptomatic osteochondroma. A three- to eight-year follow-up study. *J Bone Joint Surg Br* 2003; 85(8): 1161-5.
5. Medlar RC, Sprague HH. Osteochondroma of the carpal scaphoid. *J Hand Surg Am* 1979; 4(2): 150-1.
 6. Barfred T. Scaphoid osteochondroma. *J Hand Surg Br* 1997; 22(6): 825-6.
 7. Stahl S, Rayek S. Scaphoid osteochondroma with scapholunate dissociation--a case report. *Hand Surg 2000*; 5(1): 73-5.
 8. Van Alphen JC, Te Staa RL, Eulderink F, Obermann WR. Solitary osteochondroma of the scaphoid: a case report. *J Hand Surg Am* 1996; 21(3): 423-5.
 9. Harris NJ, Bell MJ. Bilateral scaphoid exostoses. *J Hand Surg Br* 1995; 20(6): 745.
 10. De Smet L, Degreef I. Bilateral osteochondroma of the scaphoid causing scapholunate dissociation: a case report. *Chir Main* 2007; 26(3): 141-2.

Received: 4.4.2009
Accepted: 28.7.2009

Scaphoid Osteochondroma: a Case Report

Mohammad Javdan, MD^{*}, Mehdi Motififard MD^{*},
Mehdi Teimouri MD

^{*} Assistant Professor, Department of Orthopedic Surgery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

^{**} Resident, Department of Orthopedic Surgery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

Case Report:	Abstract A case with scaphoid osteochondroma (exostosis) with wrist pain and tender mass. In this case, mass resection was performed with excellent outcome.
Key words:	Osteochondroma; Exostosis; Scaphoid.
Page count:	5
Tables:	-
Figures:	-
References:	10
Address of Correspondence:	Mehdi Teimouri, Resident, Department of Orthopedic Surgery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. E-mail: dr.teimouri@yahoo.com