

## عوامل پیش‌گویی کنندهٔ نیاز به لوله گذاری تراشه در مسمومین با سم ارگانوفسفره

دکتر نسترن ایزدی مود<sup>۱</sup>، دکتر متین شریعتی<sup>۲</sup>، دکتر احمد میراقی<sup>۱</sup>، دکتر فرزاد قشلاقی<sup>۱</sup>،  
دکتر غلامرضا معصومی<sup>۳</sup>، دکتر زهرا دانا سیادت<sup>۴</sup>

### خلاصه

**مقدمه:** مسمومیت با سم ارگانوفسفره چهارمین علت شایع مراجعه به اورژانس مسمومین بیمارستان نور اصفهان و دومین مسمومیت منجر به مرگ در این مرکز شناخته شده است. با توجه به محدودیت امکانات درمانی، تشخیص به موقع و اتخاذ تدابیر مناسب بر اساس علایم بد و رود جهت بستری بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه، راهکاری جهت نجات جان این بیماران خواهد بود که مرگ و میر و عوارض مسمومیت را به طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد. آگاهی از عوامل پیش‌گویی کنندهٔ نیاز به لوله گذاری می‌تواند پزشک را در تصمیم‌گیری در مورد بیماران و انجام درمان مناسب یاری دهد.

**روشن‌ها:** این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و مقاطعی بود که طی ۱۶ ماه و در اورژانس بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) شهر اصفهان انجام گرفت. بیماران طی بستری به دو گروه بیماران با لوله گذاری تراشه و بدون لوله گذاری تراشه تقسیم شدند. عوامل پیش‌گویی کنندهٔ احتمالی نیاز به لوله گذاری تراشه در بیماران مورد مطالعه تعیین شد و در دو گروه بیماران مقایسه و بررسی شد.

**یافته‌ها:** تعداد ۴۳ بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. ۸ نفر از آن‌ها (۱۸/۶ درصد) لوله گذاری تراشه شدند. شیوع علایم موسکارینی (۸/۴ درصد) و علایم عصبی (۴۴/۲ درصد) از علایم نیکوتینی (۳۹/۵ درصد) بیشتر بود. شایع‌ترین عالمت در مسمومین با ترکیبات ارگانوفسفره در این مطالعه، استفراغ (۵۵/۸ درصد)، سیالوره (۴۱/۹ درصد)، تغییر سطح هوشیاری (۳۰/۲ درصد)، میوز (۲۳/۳ درصد) و تعریق (۲۳/۳ درصد) بود. ۵ نفر (۱۱/۶ درصد) از افراد مطالعه فوت کردند. بین علایم میوز، دیسترس تنفسی، برونوکوره، علایم ترکیبی، علایم عصبی، کاهش سطح هوشیاری و غیر طبیعی بودن سمع ریه در دو گروه لوله گذاری شده و افرادی که لوله گذاری برای آن‌ها انجام نشده بود، اختلاف معنی‌داری وجود داشت. سن بیشتر از ۳۵ سال، فشار خون دیاستولی بیشتر از ۹۰ میلی‌متر جیوه در اولین معاینه، سمع غیر طبیعی ریه، قند خون وی بیش از ۱۲۶ میلی‌گرم در دسی‌لیتر، کاهش سطح هوشیاری بیمار، داشتن علایم عصبی، داشتن علایم ترکیبی، بروز میوز، برونوکوره یا دیسترس تنفسی، عوامل پیش‌گویی کنندهٔ نیاز به لوله گذاری تراشه شناخته شدند.

**نتیجه‌گیری:** شناخت عوامل پیش‌گویی کنندهٔ نیاز به لوله گذاری تراشه می‌تواند به پزشک در جهت انجام لوله گذاری و انتقال بیمار به واحد مراقبت‌های ویژه و در نتیجه کاهش مرگ و میر بیماران، کمک کند.

**واژگان کلیدی:** ارگانوفسفره، علایم موسکارینی، علایم نیکوتینی، پیانند.

است که مرگ و میر بالایی دارد (۱-۳). حدود ۸۰ درصد سوموم کشاورزی مورد استفاده در آمریکا را ارگانوفسفره تشکیل می‌دهد (۴). این ترکیبات مانند حشره‌کش‌هایی هستند که با مهار آنزیم استیل کولین استراز منجر به پیدایش مسمومیت در انسان می‌شوند (۵). مسمومیت با ترکیبات ارگانوفسفره شرایط جدی و

### مقدمه

در بعضی از مناطق برای مبارزه با آفات نباتی سوموم ارگانوفسفره به وفور توزیع می‌شود. به دلیل سهولت دستیابی به این سوموم، بالطبع مسمومیت ناشی از آن‌ها نیز از همهٔ انواع دیگر سوموم بیشتر است و یکی از مشکلات اصلی کلینیکی در دنیا به خصوص جهان سوم

<sup>۱</sup> دانشیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکدهٔ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

<sup>۲</sup> پزشک عمومی، دانشکدهٔ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

<sup>۳</sup> استادیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکدهٔ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

<sup>۴</sup> استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکدهٔ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

نویسنده‌ی مسئول: دکتر متین شریعتی

عروقی شامل تاکیکارדי، برادیکارדי، هایپرتانسیون، هایپوتانسیون و آریتمی و عالیم تنفسی شامل تاکیپنه، برادیپنه و یا ادم حاد ریه نیز دیده می شود (۱۵-۱۷). شایع ترین علت فوت در این مسمومیت نارسایی تنفسی ناشی از سرکوب تنفسی به علت ضعف عضلات تنفسی، سرکوب سیستم عصبی مرکزی و بروونکوره می باشد (۹). یکی از انديکاسيون‌های بستری بیماران در واحد مراقبت‌های ویژه (Intensive care unit) یا (ICU) نیاز به لوله گذاری تراشه (ایتوپاسیون) است. از انديکاسيون‌های لوله گذاری داخل تراشه در این بیماران دیرسیون تنفسی، بروونکوره، پنومونی، ادم حاد ریه، سطح هوشیاری متغیر و کما می باشد (۱۸، ۱۹). اگر چه تعداد بسیاری از بیماران مسموم با ارگانوفسفره دارای این عالیم، با استفاده از درمان آنتی دوت، نیاز به لوله گذاری داخل تراشه پیدا نمی کنند، اما تعدادی از بیماران مسموم با این سموم با وجود استفاده از پادزه رها پاسخ کامل به درمان نمی دهند و نیاز به لوله گذاری داخل تراشه با یا بدون استفاده از دستگاه تهويه مکانيکي پیدا می کنند.

بعضی از مراکز پیشرفته، کلیه بیماران مسموم با ارگانوفسفره را بدون این که به شدت عالیم و نشانه های بالینی توجه نمایند به بخش مراقبت‌های ویژه انتقال می دهند (۱۹). با توجه به محدودیت امکانات درمانی، تشخیص به موقع و اتخاذ تدابیر مناسب بر اساس عالیم بد و ورود جهت بستری بیماران در ICU راهکاری جهت نجات جان این بیماران خواهد بود و مرگ و میر و عوارض مسمومیت را به طور چشمگیری کاهش می دهد (۲۰).

اگر چه مطالعات در زمینه پیايند بیماران مسموم در مناطق مختلف انجام شده است (۲۱-۲۳)، اما تاکنون

کشنده‌ای ایجاد می کند (۶). به تازگی در یک تحقیق مرگ و میر سالانه ناشی از این سموم در جهان ۲۵۸۲۴ نفر گزارش شده است (۷). مطالعات مختلف مرگ و میر به علت مسمومیت با ارگانوفسفره را بین ۳ تا ۲۵ درصد گزارش کرده‌اند (۸-۹). این رقم در سطح آسیا بین ۵ تا ۳۰ درصد تخمین زده شده است (۱۰). گرچه مسمومیت و آلدگی با این سم در تمام کشورها اتفاق می افتد، اما در کشورهای جهان سوم به دلیل سطح پایین مراقبت‌های صنعتی و بهداشت کار، بروز مسمومیت با آن و مرگ و میر ناشی از آن بالاتر است (۱۱). در کشور ما نیز ارگانوفسفره کاربرد وسیعی در صنعت کشاورزی به عنوان سم حشره کش دارد. طبق مطالعه‌ی انجام شده در اصفهان، این ماده چهارمین مسمومیت شایع و دومین مسمومیت منجر به مرگ در بیماران مراجعه کننده به بخش مسمومین مرکز پزشکی نور بود (۱۲).

بیشتر مسمومیت‌های ناشی از حشره‌کش‌های ارگانوفسفره از طریق خوراکی، تماس با پوست و استنشاقی و به ندرت به صورت داخل عضلانی یا وریدی اتفاق می افتد (۱۳). مهار استیل کولین استراز منجر به تجمع استیل کولین در سیناپس‌های کولینرژیک می شود و این مسئله دامنه‌ای از تظاهرات بالینی را ایجاد می کند (۱۴).

از عالیم شایع مسمومیت با این سم عالیم موسکارینی (افزایش ترشحات شامل سیالوره، اشک ریزش، بروونکوره، بی اختیاری ادرار و مدفوع، استفراغ و میوز)، عالیم نیکوتینی (هیپرتانسیون، هیپرگلیسمی، میوز)، عالیم سیستم عصبی مرکزی (سردرد، بی قراری، سایکوز، گیجی تا کما و تشنجه) می باشد. عالیم قلبی-

مراحل اولیه داشت، این اقدامات اولویت نداشته، بلکه با سرعت به بررسی و برقراری راه هوایی و تنفس و گردش خون مبادرت ورزیده شد (۱۷).

سپس بیماران را از نظر عالیم بالینی به چهار گروه بیماران با عالیم موسکارینی، بیماران با عالیم نیکوتینی، بیماران با عالیم سیستم عصبی مرکزی و بیماران با حداقل ۲ علامت از عالیم گفته شده، تقسیم کردیم. بیماران طی بستری به دو گروه بیماران با لوله گذاری تراشه و بدون لوله گذاری تراشه تقسیم شدند. عوامل مختلف مانند سن، جنس، فاصله‌ی زمانی مصرف مسمومیت با ارگانوفسفره تا اولین اقدام درمانی (شستشوی معده، تجویز زغال فعال و استفاده از پادزه‌ر)، نوع سم ارگانوفسفره، مصرف داروهای همزمان، ضربان قلب، تعداد تنفس، درجه‌ی حرارت، Mean arterial pressure (MAP)، عالیم چهارگانه‌ی بالینی، الکتروولیت‌ها (سدیم و پتاسیم)، قند خون، اوره، کراتینین و وضعیت هوشیاری بدو ورود در بیماران مورد مطالعه بین دو گروه تعیین و در چکلیست مربوط به هر بیمار ثبت گردید. پیايند به صورت بهبودی و مرگ و میر بررسی شد.

سپس اطلاعات به دست آمده در نرمافزار SPSS نسخه‌ی ۱۶ (SPSS Inc., Chicago, IL) با استفاده از آزمون‌های Student-t،  $\chi^2$  و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  $P < 0.05$  معنی‌دار در نظر گرفته شد.

### یافته‌ها

طی ۱۶ ماه ۵۲ نفر به دلیل مسمومیت با ترکیبات ارگانوفسفره به بخش مسمومین بیمارستان نور و

مطالعه‌ای در زمینه‌ی بررسی عوامل مختلف به عنوان عوامل پیش‌گویی کننده‌ی نیاز به لوله گذاری تراشه انجام نشده است. بنابراین با توجه به این که مسمومیت با ارگانوفسفره از شایع‌ترین علل مرگ و میر در بخش مسمومین می‌باشد و با توجه به این که امکانات و تجهیزات پزشکی جهت بستری بیماران در ICU محدود می‌باشد، آگاهی از عوامل پیش‌گویی کننده می‌تواند پزشک را در تصمیم‌گیری در مورد بیماران نیازمند به ایتوپاپسیون یاری دهد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیش‌گویی کننده انجام گردید تا بتوان در آینده با آمادگی بهتری با بیماران مسموم با ارگانوفسفره روبرو شد.

### روش‌ها

مطالعه‌ی انجام شده از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی بود. جامعه‌ی هدف کلیه‌ی بیمارانی بودند که از اول تیر ماه ۱۳۸۸ تا آخر مهر ۱۳۸۹ به علت مسمومیت با سوم ارگانوفسفره در اورژانس بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) شهر اصفهان پذیرش و در بخش مسمومین این بیمارستان درمان شدند.

معیار ورود به مطالعه تشخیص مسمومیت با ارگانوفسفره بر اساس شرح حال و عالیم بالینی مسمومیت با ارگانوفسفره، پاسخ درمانی به آتروپین و یا پرالیدوکسیم بود. بیمارانی که به بیمارستان‌های دیگر اعزام شدند یا در بدو ورود با رضایت شخصی تشخیص شدند، از مطالعه خارج گردیدند.

بعد از گرفتن شرح حال بالینی، بیماران مورد ارزیابی قرار گرفتند و کلیه‌ی عالیم بالینی و آزمایشگاهی مسمومیت در بدو ورود در پرونده و چکلیست ثبت شد. در صورتی که بیمار نیاز به احیا در

افرادی که نیاز به لوله گذاری تراشه پیدا کردند، شغل آزاد، ۲ نفر خانه‌دار، ۲ نفر دانشجو و ۲ نفر بازنشسته بودند. در این بررسی بین نوع شغل مسمومین و نیاز به انتوپاسیون اختلاف معنی‌داری یافت نشد ( $P = 0.138$ ). در ۱۷ بیمار (۳۹/۵ درصد) شرح حال دهنده از نام سم اطلاع نداشت و در محل وقوع مسمومیت نیز سم را نیافتدن. بیشترین میزان سم مصرفی در مسمومین این مطالعه سم دیازنون (۲۳/۳ درصد) و سم مالایتون (۱۱/۶ درصد) بود. سم کلریدیفوس نیز عامل مسمومیت در ۳ نفر از بیماران (۷ درصد) بود. سموم دیگر ارگانوفسفره شامل کوراکون ۴۰ درصد، دی‌کلروفوس، پرومتانوس، فوزانون، اکسی کلروفوس، اکسی متون متیل، زولون همراه با آدمیرال هر کدام عامل مسمومیت یک نفر (۲/۳ درصد) از بیماران بودند. در آزمون  $\chi^2$  اختلاف معنی‌داری در دو گروه مورد مطالعه از نظر نوع سم وجود نداشت.

از ۴۳ مسموم، ۴ نفر از داروی دیگری نیز همراه با سم ارگانوفسفره استفاده کرده بودند که شامل الكل، کورتیکواسترویید، گاز CO و حشیش بود.

حضرت علی اصغر (ع) شهر اصفهان مراجعه کردند که ۹ نفر به دلیل کامل نبودن مدارک و رضایت شخصی جهت ترجیح بلافضله در بد و ورود به بیمارستان از مطالعه حذف شدند و ۴۳ بیمار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند که ۲۶ نفر آنها (۶۰/۵ درصد) مرد و ۱۷ نفر (۳۹/۵ درصد) زن بودند (فراوانی مردان نسبت به زنان ۱/۵ برابر بود).

۱۱ نفر (۲۵/۶ درصد) از بیماران اکسیژن دریافت کردند، ۸ نفر (۱۸/۶ درصد) لوله گذاری تراشه شدند و ۷ نفر (۱۶/۳ درصد) تحت تهییه مکانیکی قرار گرفتند.

میانگین سنی در کل بیماران مسموم با ترکیبات ارگانوفسفره در این مطالعه  $14.26 \pm 5.01$  سال (حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۹ سال) بود. ۴۶/۵ درصد بیماران متاهل بودند. مشخصات بیماران در دو گروه لوله گذاری شده و لوله گذاری نشده در جدول ۱ با هم مقایسه شده است.

بیشترین شغل در افراد مورد مطالعه، شغل آزاد (۳۸/۹ درصد) و خانه‌دار (۳۰/۶ درصد) بود. ۲ نفر از

جدول ۱. مشخصات بیماران در دو گروه بیماران با لوله گذاری تراشه و بدون لوله گذاری تراشه

مقدار P	لوله گذاری تراشه (+)	لوله گذاری تراشه (-)	مؤلفه‌ی مورد بررسی	سن (سال)*
۰.۱۰۱۸	$45.7 \pm 18.3$	$25.8 \pm 10.3$		
۰.۸۹۶	۵ (۶۲/۵)	۲۱ (۶۰)	مذکور	
	۳ (۳۷/۵)	۱۴ (۴۰)	مؤنث	
۰.۰۷۳	۲ (۲۵)	۲۱ (۶۰)	مجرد	
	۶ (۷۵)	۱۴ (۴۰)	مؤنث	وضعیت تأهل **
۰.۴۷۹	۸ (۱۰۰)	۳۳ (۹۴/۳)	خوارکی	
	۰ (۰)	۱ (۲/۹)	پوست	طریقه‌ی مسمومیت **
	۰ (۰)	۱ (۲/۹)	استشاقی	
۰.۷۳۰	۷ (۸۷/۵)	۳۲ (۹۱/۴)	صرف نکرده	
	۱ (۱۲/۵)	۳ (۸/۶)	صرف کرده	داروی همزمان **
۰.۳۲۶	$62.0 \pm 32.7$	$21.5 \pm 3.3$	فاصله زمانی صرف سم تا اولین اقدام درمانی (دقیقه) <sup>†</sup>	

\* مقادیر به صورت انحراف معیار  $\pm$  میانگین نشان داده شده است.

\*\* مقادیر به صورت (درصد) تعداد نشان داده شده است.

جدول ۲. مقایسه علایم حیاتی و پرالیدوکسیم مورد نیاز در بیماران مورد مطالعه

P	مقدار	لوله گذاری تراشه (-)	لوله گذاری تراشه (+)	متغیر
		انحراف معیار $\pm$ میانگین	انحراف معیار $\pm$ میانگین	
۰/۰۴۲	۹۵/۰ $\pm$ ۱۸/۴۳	۸۲/۴۷ $\pm$ ۱۲/۵۱		تعداد ضربان قلب در دقیقه
۰/۷۶۶	۱۹ $\pm$ ۱۱/۰۸	۱۷/۵۵ $\pm$ ۴/۵		تعداد تنفس در دقیقه
۰/۸۸۸	۱۱۶/۰۸ $\pm$ ۱۵/۷۱	۱۱۲/۹۴ $\pm$ ۱۲/۹۱		فشار خون شریانی سیستولی (میلی متر جیوه)
۰/۰۰۱	۸۴/۱۶ $\pm$ ۱۰/۲۰	۶۸/۶۷ $\pm$ ۹/۷۹		فشار خون شریانی دیاستولی (میلی متر جیوه)
۰/۸۴۴	۳۷/۰۶ $\pm$ ۱/۰۴	۳۶/۹۷ $\pm$ ۰/۲۸		درجی حرارت بدن (درجه سانتی گراد)
۰/۳۰۹	۱۳۹ $\pm$ ۶/۰۲	۱۳۷/۲۷ $\pm$ ۴/۹۷		سدهم خون (میلی اکی والان در لیتر)
۰/۸۰۸	۳/۸۲ $\pm$ ۰/۷۲	۳/۹۲ $\pm$ ۱/۱۱		پتاسیم خون (میلی اکی والان در لیتر)
۰/۰۴۲	۲۸۳/۷۵ $\pm$ ۱۹۷/۸۴	۱۰/۹/۷۱ $\pm$ ۲۸/۷۴		قند خون (میلی گرم در دسی لیتر)
۰/۱۰۸	۱/۱۰ $\pm$ ۰/۳۲	۰/۹۲ $\pm$ ۰/۲۴		کراتینین سرم (میلی گرم در دسی لیتر)
۰/۲۸۱	۱۸/۳۷ $\pm$ ۱۰/۲۲	۱۴/۰۹ $\pm$ ۳/۹۷	BUN	Blood urea nitrogen (میلی گرم در دسی لیتر)
۰/۰۲۰	۲۷/۷۵ $\pm$ ۷/۹۳	۳/۹۰ $\pm$ ۱/۴۱		آتروپین مصرفی در ۲۴ ساعت اول (میلی گرم)
۰/۱۶۴	۹/۸۱ $\pm$ ۵/۳۰	۱/۵۵ $\pm$ ۰/۲۵		پرالیدوکسیم مصرفی در ۲۴ ساعت اول (گرم)
۰/۰۲۵	۸۱/۳۷ $\pm$ ۲۶/۹۰	۴/۸۷ $\pm$ ۱/۸۱		کل آتروپین مصرفی (میلی گرم)
۰/۰۱۴	۱۸/۹۳ $\pm$ ۵/۱۸	۱/۹۷ $\pm$ ۰/۳۷		کل پرالیدوکسیم مصرفی (گرم)

دوره‌ی بستره اختلاف معنی‌داری داشتند.

علایم بیماران به طور کلی و به تفکیک در دو گروه در جدول ۳ نشان داده شده است. فراوانی علایم موسکارینی در هر دو گروه از سایر علایم بیشتر بود. به علاوه بین فراوانی میوز، دیسترس تنفسی، برونکوره، علایم ترکیبی، علایم عصبی و کاهش سطح هوشیاری در دو گروه بیماران مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری وجود داشت.

در طول زمان بستره ۴ نفر دچار پنومونی آسپیراسیون شدند که یک نفر از آنها در نهایت فوت شد. بین وقوع عوارض و نیاز به آنتیوباسیون بر اساس آزمون  $\chi^2$  ارتباط معنی‌داری وجود داشت ( $P < 0.001$ ). میانگین مدت زمان بستره بیمارانی که نیاز به لوله گذاری تراشه پیدا کردند،  $۸۴ \pm ۲۳$  ساعت و در گروه دیگر  $۴ \pm ۲۸/۵$  ساعت بود ( $P = 0.051$ ).

در بیماران این مطالعه، روش اصلی مسمومیت راه خوراکی بود که ۴۱ نفر (۹۵/۳ درصد) از این راه مسموم شده بودند و تنها یک نفر از راه پوست (۲/۳ درصد) و یک نفر از راه استنشاق (۲/۳ درصد) با سم ارگانوفسفره تماس داشتند. همچنین ۸۶ درصد افراد به طور عمده و به قصد خودکشی از این سموم مصرف کرده بودند.

در جدول ۲ دو گروه بیماران مورد مطالعه از نظر علایم حیاتی و برخی مشخصات درمانی و آزمایشگاهی در بدء ورود مقایسه شده‌اند. همان گونه که در جدول ۲ دیده می‌شود، تعداد ضربان قلب، فشارخون شریانی دیاستولی و قند خون در دو گروه تفاوت معنی‌داری داشت. همچنین دو گروه بیماران از نظر میانگین آتروپین مصرفی در ۲۴ ساعت و آتروپین و پرالیدوکسیم مصرفی کل در طول

در طول درمان، قند خون و نوع درمان را بر روی لوله گذاری تراشه بر اساس آزمون رگرسیون نشان می‌دهد. بیشترین میزان مراجعه‌ی بیماران به بیمارستان در طول بهار و تابستان و اولین ماه پاییز بود.

۵ نفر (۱۱/۶ درصد) از افراد مورد مطالعه فوت کردند که همه‌ی آن‌ها در گروه لوله گذاری شده بودند ( $P < 0.001$ ).

جدول ۴ میزان ارتباط عالیم بیمار در بدرو ورود و

جدول ۳. عالیم و نشانه‌های بیماران در کل و به تفکیک دو گروه در بدرو ورود

متغیر	کل	درصد	کل	لوله گذاری تراشه (+)	لوله گذاری تراشه (-)	مقدار
				(درصد) تعداد	(درصد) تعداد	(+)
عالیم موسکارینی	۸۷/۴	۲۱ (۸۷/۵)	۲۱ (۸۷/۶)	۷ (۸۷/۵)	۱۴ (۴۰)	۰/۹۳۲
سیالوره	۴۱/۹	۱۴ (۴۰)	۱۴ (۴۰)	۴ (۵۰)	۱ (۱۲/۵)	۰/۶۰۵
اشکریزش	۴/۷	۱ (۲/۹)	۱ (۲/۹)	۱ (۱۲/۵)	۱ (۱۲/۵)	۰/۲۴۳
بی اختیاری ادرار	۷	۲ (۵/۷)	۲ (۵/۷)	۱ (۱۲/۵)	۱ (۱۲/۵)	۰/۴۹۷
بی اختیاری مدفوع	۴/۷	۱ (۲/۹)	۱ (۲/۹)	۱ (۱۲/۵)	۲ (۲۵)	۰/۴۵۸
استفراغ	۵۵/۸	۲۲ (۶۲/۹)	۲۲ (۶۲/۹)	۲ (۲۵)	۰ (۰)	۰/۰۵۲
برادیکاردی	۴/۷	۲ (۵/۷)	۲ (۵/۷)	۰ (۰)	۴ (۵۰)	۰/۴۸۹
دیسترس تنفسی	۱۶/۳	۳ (۸/۶)	۳ (۸/۶)	۴ (۵۰)	۰ (۰)	۰/۰۰۴
کرامپ	۱۶/۳	۷ (۲۰)	۷ (۲۰)	۰ (۰)	۴ (۵۰)	۰/۱۶۷
برونکوره	۱۱/۶	۱ (۲/۹)	۱ (۲/۹)	—	۰ (۰)	< ۰/۰۰۱
تاری دید	۰	۰ (۰)	۰ (۰)	—	۶ (۷۵)	< ۰/۰۰۱
میوز	۲۳/۳	۴ (۱۱/۴)	۴ (۱۱/۴)	۳ (۳۷/۵)	۳ (۳۷/۵)	۰/۲۹۰
تعريق	۲۳/۳	۷ (۲۰)	۷ (۲۰)	۵ (۶۲/۵)	۵ (۶۲/۵)	۰/۱۴۱
عالیم نیکوتینی	۳۹/۹	۱۲ (۳۴/۳)	۱۲ (۳۴/۳)	۲ (۲۵)	۲ (۲۵)	۰/۳۱۸
فاسیکولاسیون	۱۴	۴ (۱۱/۴)	۴ (۱۱/۴)	۱ (۱۲/۵)	۱ (۱۲/۵)	۰/۷۴۸
ضعف	۱۶	۶ (۱۷/۱)	۶ (۱۷/۱)	۲ (۲۵)	۲ (۲۵)	۰/۳۱۸
تاکیکاردی	۱۴	۴ (۱۱/۴)	۴ (۱۱/۴)	۰ (۰)	۰ (۰)	۰/۰۹۰
هایپرتانسیون	۹/۳	۲ (۵/۷)	۲ (۵/۷)	۰ (۰)	۰ (۰)	۰/۴۸۹
میدریاز	۴/۷	۲ (۵/۷)	۲ (۵/۷)	۷ (۸۷/۵)	۷ (۸۷/۵)	۰/۰۰۶
عالیم عصبی	۴۴/۲	۱۲ (۳۴/۳)	۱۲ (۳۴/۳)	۰ (۰)	۰ (۰)	—
اضطراب	۰	۰ (۰)	۰ (۰)	۰ (۰)	۰ (۰)	۰/۴۸۹
بی قراری	۴/۷	۲ (۵/۷)	۲ (۵/۷)	۰ (۰)	۰ (۰)	—
سردرد	۰	۰ (۰)	۰ (۰)	۰ (۰)	۰ (۰)	۰/۳۱۵
سرگیجه	۹/۳	۴ (۱۱/۴)	۴ (۱۱/۴)	۰ (۰)	۰ (۰)	۰/۶۲۹
تشنج	۲/۳	۴ (۲/۹)	۴ (۲/۹)	۰ (۰)	۰ (۰)	< ۰/۰۰۱
کاهش سطح	۳۰/۲	۶ (۱۷/۱)	۶ (۱۷/۱)	(۸۷/۵)	(۸۷/۵)	۰/۰۰۱
عالیم ترکیبی	۱۵ (۴۲/۹)	۱۵ (۴۲/۹)	۷ (۸۷/۵)	۷ (۸۷/۵)	۷ (۸۷/۵)	۰/۰۲۳

جدول ۴. نقش عوامل مختلف در پیش‌گویی نیاز به لوله گذاری تراشه در بیماران مسموم با ترکیبات ارگانوفسفره

مؤلفه مورد بررسی	مقدار OR	P	حدوده اطمینان ۹۵ درصد	مکانیزم
علایم ترکیبی	۹/۳۳۳	۰/۰۴۷	۸۴/۲۰۳	۱/۰۳۵
آتروپین مصرفی در روز اول < ۱۱ میلی گرم	۹/۳۳۳	۰/۰۱۷	۵۸/۰۱۶	۱/۵۰۱
پرالیدوکسیم مصرفی روز اول < ۴ گرم	۶/۲۰۰	۰/۰۵۴	۳۹/۷۵۸	۰/۹۶۷
کل آتروپین مصرفی در طول بستری < ۲۱ میلی گرم	۱۰/۱۵۰	< ۰/۰۰۱	۱۲۸۴/۹۱۸	۸/۰۱۸
کل پرالیدوکسیم مصرفی در طول بستری < ۴/۱ گرم	۷۲/۳۳۳	< ۰/۰۰۱	۸۰/۳/۱۱۰	۶/۵۱۵
داشتن دیسترس تنفسی	۱۰/۶۶۷	۰/۰۱۱	۶۵/۹۹۴	۱/۷۲۴
داشتن میوز	۲۳/۲۵۰	۰/۰۰۱	۱۵۶/۸۹۲	۳/۴۴۵
داشتن بروونکوره	۳۴	۰/۰۰۴	۳۸۳/۸۴۴	۳/۰۱۲
قد خون بیشتر یا مساوی ۱۲۶ میلی گرم در دسی لیتر	۲۵/۶۶۷	۰/۰۰۵	۲۵۱/۳۰۳	۲/۶۲۱
سن < ۳۵ سال	۱۴/۵۰۰	۰/۰۰۴	۹۰/۰۱۶	۲/۳۳۶
سمع ریهی غیر طبیعی	۷۴/۶۶۷	< ۰/۰۰۱	۸۲۸/۳۵۰	۶/۷۳۰
کاهش سطح هوشیاری	۳۳/۸۲۳	۰/۰۰۲	۳۲۸/۲۱۱	۳/۴۸۸
فشار خون دیاستولی بیشتر مساوی ۹۰ میلی متر جیوه	۱۳/۲۰۰	۰/۰۵۰	۱۷۳/۸۸۱	۱/۰۰۲
تعداد تنفس بیشتر از ۲۴ یا کمتر از ۱۲ تا در دقیقه	۶/۶۶۷	۰/۰۲۵	۳۴/۸۴۲	۱/۲۷۶

## حشره‌کش در لرستان نیز، آمار بیماران متأهل

۳۵/۹ درصد بود (۲۷).

بیشترین میزان مراجعه‌ی بیماران به بیمارستان در طول بهار و تابستان و اولین ماه پاییز بوده است که مطابق با زمان افت زدایی محصولات کشاورزی می‌باشد. طبق یک بررسی انجام شده در کره‌ی جنوبی نیز، میزان مرگ و میر به علت مسمومیت با سموم حشره‌کش، در اوخر بهار و در طول تابستان (از اردیبهشت تا شهریور) افزایش قابل ملاحظه‌ای نسبت به پاییز و زمستان دارد (۲۸).

بیماران از نظر شغلی نیز بررسی شدند و بیشترین شغل افراد در مطالعه، شغل آزاد و سپس خانه‌داری بود. انجام یک بررسی در مرکز کنترل مسمومیت در پاتارای بزریل نیز متجه به نشر یک مقاله در سال ۲۰۱۰ شد که اظهار می‌داشت، بیشترین تلاش خودکشی در مردان بیکار، زنان خانه‌دار و بازنیسته بوده است (۲۹).

## بحث

در این مطالعه ۴۳ بیمار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند و فراوانی مردان ۱/۵ برابر زنان بود. این نسبت در مطالعه‌ای وسیع در کشور هندوستان نیز با ارجحیت جنس مذکور (۲/۶ برابر) گزارش شده است (۲۴)، اما در مطالعه‌ای دیگر در ترکیه از ۶۲ بیمار که طی ۲۴ ماه به بیمارستان مراجعه نموده بودند، ۵۳/۷ درصد زن بوده‌اند (۲۵).

میانگین سن بیماران نیازمند به انتوپاسیون در مقایسه با میانگین سن بیماران بدون نیاز به انتوپاسیون به طور معنی‌داری بیشتر بود. در مطالعه‌ای اخیر در سال ۲۰۱۱ در ترکیه نیز میانگین سن بیماران مسموم با ارگانوفسفره‌ی بستری در واحد مراقبت‌های ویژه بالاتر و در حد ۳۷ سال بوده است (۲۶).

در این مطالعه ۴۶/۵ درصد کل بیماران متأهل بودند، در بررسی اپیدمیولوژیک موارد مسمومیت با سوم

استنشاقی با ترکیبات ارگانوفسفره مسموم شده‌اند (۳۱). طبق مطالعه‌ای در کشور ترکیه در ۴۷ بیمار مسموم با ارگانوفسفره که در واحد مراقبت‌های ویژه بستری شده بودند، شایع‌ترین عالیم میوز، تغییر سطح هوشیاری، سیالوره و فاسیکولاسیون بود (۳۲). این عالیم با یافته‌های مطالعه‌ی ما مشابهت دارد.

بررسی‌ها در این مطالعه نشان داد که شیوع عالیم موسکارینی و سپس عالیم عصبی از عالیم نیکوتینی بیشتر بود. همچنین در یک مطالعه‌ی صورت گرفته روی ۲۳ بیمار مسموم با سم ملاتیون نیز شیوع عالیم موسکارینی ۸۳ درصد، عالیم عصبی ۷۸ درصد و عالیم نیکوتینی ۱۷ درصد بود (۱۸).

در بین بیماران داشتن عالیم موسکارینی، نیکوتینی یا عصبی ۲ نوع علامت از عالیم موسکارینی، نیکوتینی یا عصبی نیاز به ایتوپاسیون را پیش‌گویی می‌کند. تاکنون مطالعه‌ای بر اساس قرار گرفتن بیمار در گروه‌های چهارگانه‌ی عالیم خطر نیاز به لوله گذاری تراشه را بررسی نکرده است.

نتایج مطالعه‌ی ما نشان داد که میانگین تعداد ضربان قلب فرد مسموم هنگام ورود به اورژانس و همچنین میانگین فشار خون شریانی دیاستولی در دو گروه بیماران مورد بررسی اختلاف معنی‌داری داشت. به علاوه مطالعه‌ی حاضر نشان داد در صورتی که بیمار در بد و ورود فشار خون شریانی دیاستولی بیشتر از ۹۰ میلی‌متر جیوه یا تعداد تنفس بیشتر از ۲۴ یا کمتر از ۱۲ داشته باشد، احتمال نیاز به لوله گذاری تراشه برای وی زیاد است. بنابراین پزشک معالج و یا مسؤول اورژانس می‌تواند پس از انجام معاینات ساده و سریع اولیه، احتمال این خطر را برآورد و آمادگی لازم جهت مراقبت‌های ویژه را فراهم آورد. اگر چه در خصوص

در طول مدت بستری ۱۸/۶ درصد لوله گذاری تراشه شدند و در نهایت ۱۱/۶ درصد از افراد مورد مطالعه فوت کردند. در یک مطالعه صورت گرفته روی ۳۷۶ بیمار مسموم با ارگانوفسفره، ۲۴ درصد از بیماران نیازمند به لوله گذاری تراشه و حمایت تنفسی شدند و ۱۲/۲ درصد از کل بیماران فوت کردند (۳۰)، که تا حدودی با مطالعه‌ی ما مشابهت دارد و نشان می‌دهد مسمومیت با ارگانوفسفره می‌تواند منجر به نیاز به حمایت‌های تنفسی شود.

هیچ ارتباط معنی‌داری بین جنس بیماران، وضعیت تأهل، نوع شغل مسمومین، نوع سم، مصرف داروی همراه، راه مسمومیت، علت مسمومیت، مقدار سم، فاصله‌ی زمانی مصرف تا اولین اقدام درمانی و مراقبتی با نیاز به لوله گذاری تراشه یافت نشد.

در این بررسی اختلاف معنی‌داری از نظر نوع سم و نیاز به لوله گذاری تراشه وجود نداشت. نتایج یک مطالعه نشان داد که نوع سم ارگانوفسفره در تعیین پیایند بیماران با اهمیت است و ترکیباتی از ارگانوفسفره مثل فتیون که حلالیت بالاتری در چربی دارند موجب بروز اثرات دیررس می‌شوند. نیمی از بیمارانی که در این مطالعه به علت این سم فوت شده بودند، در ابتدا فقط عالیم خفیفی داشتند. بنابراین پیشنهاد شد که بیماران مسموم با این سم (فتیون) حتی اگر در بد و ورود بدون علامت بودند، تحت مانیتورینگ دقیق قرار گیرند (۲۱).

روش اصلی مسمومیت در بیماران این مطالعه، راه خوراکی بود. در نهایت همه‌ی افرادی که نیاز به لوله گذاری تراشه پیدا کردند، در گروه مسمومین از راه خوراکی بودند. در مطالعه‌ای در پاکستان نیز ۸۲/۶ درصد بیماران از راه خوراکی و ۶ درصد از راه

قلبی (دیررس یا زودرس) را به خاطر داشت؛ چرا که غالب پیایند بدی دارند (۳۴). در نهایت ۱۱/۵ درصد از افراد مطالعه فوت کردند که همگی نیازمند به انتوپاسیون بودند. بنابراین آگاهی از عوامل خطر نیاز به لوله گذاری تراشه ممکن است بتواند با اقدام سریع پزشک در جهت انجام آن و انتقال بیمار به ICU منجر به کاهش مرگ و میر گردد. مقالات مشابه در ترکیه شیوع مرگ و میر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان در اثر مسمومیت با ترکیبات ارگانوفسفره را به ترتیب ۱۸/۷ و ۱۲ درصد گزارش کرده‌اند (۳۲، ۳۳). بررسی‌های انجام شده در کشور هندوستان نیز طی ۶ سال نشان داد که میزان مرگ و میر در این مسمومین ۱۳/۱ درصد است (۲۴). این ارقام با آمار مطالعه‌ی ما قرابت دارد.

### نتیجه‌گیری

به طور خلاصه، در این بررسی چندین مورد به عنوان عوامل خطر برای پیش‌گویی نیاز به لوله گذاری داخل تراشه مشخص شدند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به سن بیشتر از ۳۵ سال، دیسترنس تنفسی بیمار در بلو ورود، فشار خون دیاستولی بیشتر از ۹۰ میلی‌متر جیوه در اولین معاینه، سمع غیر طبیعی ریه (رال، رونکای و ویز)، کاهش سطح هوشیاری بیمار و داشتن علایم عصبی اشاره کرد.

مطالعه‌ی حاضر نشان داد که بروز هر یک از علایم میوز، برونکوره و دیسترنس تنفسی نیز یک عامل پیش‌گویی کننده‌ی نیاز به لوله گذاری داخل تراشه هستند. از بین علایم چهارگانه نیز داشتن علایم عصبی یا علایم ترکیبی (بیماران با حداقل ۲ علامت از گروه علایم نیکوتینی، موسکارینی و عصبی) عوامل خطر

تعداد تنفس و اندیکاسیون‌های نیاز به لوله گذاری تراشه این مسأله تأیید شده است، اما در نظر گرفتن عوامل خطر دیگر در کنار آن مانند تعداد ضربان قلب و یا فشار خون از یافته‌های جدید این مطالعه می‌باشد. با توجه به بررسی جواب آزمایشات پاراکلینیکی (سدیم، پتاسیم، قند خون، اوره و کراتینین) در بدو ورود بیماران، تنها قند خون در دو گروه بیماران اختلاف معنی‌داری داشت و سطح قند خون بالاتر از ۱۲۶ میلی‌گرم در دسی‌لیتر یک عامل پیش‌گویی کننده‌ی نیاز به لوله گذاری تراشه بود؛ این در حالی است که در یک مطالعه، میزان سدیم و پتاسیم سرمی مسمومین با سموم ارگانوفسفره به عنوان مؤلفه‌های با ارزش APACHE II score در پیش‌گویی پیایند نام برده شده‌اند (۱۲). مطالعات مشابه نیز هیپرگلیسیمی را در مسمومین با ارگانوفسفره نشان داده است و علت آن را ترشح ثانویه‌ی کاتکول‌آمین از مدولای آدرنال ذکر کرده‌اند (۳۲-۳۳).

در بررسی حاضر، میانگین مدت زمان بستری بیماران نیازمند به لوله گذاری تراشه  $84 \pm 223$  و در گروه دیگر  $4 \pm 28/5$  ساعت بود. مطالعه‌ای با حجم نمونه‌ی وسیع‌تر در اصفهان نیز میانگین مدت زمان بستری بیمارانی که نیاز به لوله گذاری تراشه پیدا کردند را (۷/۸-۱۵/۳) ۱۱ روز و در گروه دیگر (۲-۳) ۲ روز گزارش کرده است که به آمار مقاله‌ی حاضر نزدیک است (۲۳).

شایع‌ترین عارضه‌ی بالینی در بیماران این مطالعه پنومونی آسپیراسیون بود. با استناد به مقاله‌ای دیگر باید خاطر نشان کرد، اگر چه بروز علایم کلینیکی مسمومیت با ترکیبات ارگانوفسفره بیشتر با علایم تنفسی و عصبی است، اما همیشه باید احتمال عوارض

پرالیدوکسیم مصرف نمودند، با احتمال بالاتری نسبت به سایرین نیاز به مراقبت‌های ویژه و لوله گذاری تراشه داشته‌اند.

آگاهی از عوامل خطر می‌تواند پزشک را در تصمیم‌گیری در مورد بیماران نیازمند به ایتوپاسیون یاری دهد. با توجه به عوامل پیش‌گویی کننده‌ی شناخته شده در این مطالعه، در آینده می‌توان با آمادگی بهتری با بیماران مسموم با ارگانوفسفره روبرو شد.

نیاز به لوله گذاری تراشه نشان داده شدند. همچنین، اگر در آزمایشات اولیه‌ی فرد مسموم قند خون وی بیش از ۱۲۶ میلی‌گرم در دسی‌لیتر گزارش شود، احتمال نیاز به لوله گذاری داخل تراشه بالا است. در نهایت یافته‌های این بررسی منطبق بر این مطلب بود که آن دسته از بیمارانی که در روز اول بیش از ۱۱ میلی‌گرم آتروپین یا در کل دوره‌ی بستری بیش از ۲۱ میلی‌گرم آتروپین یا بیش از ۴/۱ گرم

## References

- Moghadamnia AA, Abdollahi M. An epidemiological study of poisoning in northern Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2002; 8(1): 88-94.
- Kanchan T, Menezes RG. Suicidal poisoning in Southern India: gender differences. J Forensic Leg Med 2008; 15(1): 7-14.
- Rahimi R, Nikfar S, Abdollahi M. Increased morbidity and mortality in acute human organophosphate-poisoned patients treated by oximes: a meta-analysis of clinical trials. Hum Exp Toxicol 2006; 25(3): 157-62.
- Cable GG, Doherty S. Acute carbamate and organochlorine toxicity causing convulsions in an agricultural pilot: a case report. Aviat Space Environ Med 1999; 70(1): 68-72.
- Clarck RF. Insecticides: organic phosphorous and compounds carbamates. In: Goldfrank FL, editor. Goldfrank S Toxicologic Emergencies. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2002. p. 1346-57.
- Noshad H, Ansarin K, Ardalani MR, Ghaffari AR, Safa J, Nezami N. Respiratory failure in organophosphate insecticide poisoning. Saudi Med J 2007; 28(3): 405-7.
- Gunnell D, Eddleston M, Phillips MR, Konradsen F. The global distribution of fatal pesticide self-poisoning: systematic review. BMC Public Health 2007; 7: 357.
- Katz K, Brooks D. Toxicity organophosphate [Online]. 2006 [cited 2006 Aug 31]; Available from: URL: [www.emedicine.medscape.com/article/167726-overview/](http://www.emedicine.medscape.com/article/167726-overview/)
- Cynthia K. Organophosphates and carbamate. In: Ford MD, Editor. Clinical toxicology. Philadelphia: WB Saunders; 2001. p. 819-29.
- Eddleston M. Patterns and problems of deliberate self-poisoning in the developing world. QJM 2000; 93(11):715-31.
- Grenvik A, Ayres SM, Shoemaker WC. Textbook of critical care. Philadelphia: WB. Saunders; 2000. p. 2074-5.
- Izadi Mod N, Gheshlagi F, Shargi E. Poisoning Lead in Death in Noor Hospital in Isfahan. Forensic Mwdicine 2003; 9(31): 122-6.
- Raina S, Mahesh DM, Sood V, Kaushal SS, Gupta D. Self injection of dichlorvos, an organophosphorus compound. Journal Of Health And Allied Sciences 2008; 7(2): 9.
- Roberts DM, Aaron CK. Management of acute organophosphorus pesticide poisoning. BMJ 2007; 334(7594): 629-34.
- Ellenhorn MJ. Organophosphate. In: Ellenhorn MJ, Editor. Ellenhorn's medical toxicology: diagnosis and treatment of human poisoning. Philadelphia: Williams & Wilkins; 1997. p. 1619-21.
- Chuang FR, Jang SW, Lin JL, Chern MS, Chen JB, Hsu KT. QTc prolongation indicates a poor prognosis in patients with organophosphate poisoning. Am J Emerg Med 1996; 14(5): 451-3.
- Brent J, Wallace KL, Burkhardt KK, Phillips SD, Donovan JW. Critical care toxicology: diagnosis and management of the critically poisoned patient. Philadelphia: Elsevier Mosby; 2005. p. 937-42.
- Lee P, Tai DY. Clinical features of patients with acute organophosphate poisoning requiring intensive care. Intensive Care Med 2001; 27(4): 694-9.
- Aather N, Ara J, Khan EA, Sattar RA, Durrani R. Acute organophosphate insecticide poisoning. J Surg Pak 2008; 13(2): 71-4.
- Grmec S, Mally S, Klemen P. Glasgow Coma Scale score and QTc interval in the prognosis of organophosphate poisoning. Acad Emerg Med

- 2004; 11(9): 925-30.
- 21.** Davies JO, Eddleston M, Buckley NA. Predicting outcome in acute organophosphorus poisoning with a poison severity score or the Glasgow coma scale. *QJM* 2008; 101(5): 371-9.
- 22.** Shadnia S, Darabi D, Pajoumand A, Salimi A, Abdollahi M. A simplified acute physiology score in the prediction of acute organophosphate poisoning outcome in an intensive care unit. *Hum Exp Toxicol* 2007; 26(8): 623-7.
- 23.** Eizadi-Mood N, Saghaei M, Jabalameli M. Predicting outcomes in organophosphate poisoning based on APACHE II and modified APACHE II scores. *Hum Exp Toxicol* 2007; 26(7): 573-8.
- 24.** Peter JV, Jerobin J, Nair A, Bennett A, Samuel P, Chrispal A, et al. Clinical profile and outcome of patients hospitalized with dimethyl and diethyl organophosphate poisoning. *Clin Toxicol (Phila)* 2010; 48(9): 916-23.
- 25.** Akdur O, Durukan P, Ozkan S, Avsarogullari L, Vardar A, Kavalci C, et al. Poisoning severity score, Glasgow coma scale, corrected QT interval in acute organophosphate poisoning. *Hum Exp Toxicol* 2010; 29(5): 419-25.
- 26.** Cander B, Dur A, Yildiz M, Koyuncu F, Girisgin AS, Gul M, et al. The prognostic value of the Glasgow coma scale, serum acetylcholinesterase and leukocyte levels in acute organophosphorus poisoning. *Ann Saudi Med* 2011; 31(2): 163-6.
- 27.** Mahmoodi GH, Asaei R. Epidemiologic Study of Organophosphate and Organochlorate. *Toxicology Journal* 2008; 10(1): 3-10.
- 28.** Lee WJ, Cha ES. Overview of Pesticide Poisoning in South Korea. *J Rural Med* 2009; 4(2): 53-8.
- 29.** Bernardes SS, Turini CA, Matsuo T. Profile of suicide attempts using intentional overdose with medicines, treated by a poison control center in Parana State, Brazil. *Cad Saude Publica* 2010; 26(7): 1366-72.
- 30.** Eddleston M, Mohamed F, Davies JO, Eyer P, Worek F, Sheriff MH, et al. Respiratory failure in acute organophosphorus pesticide self-poisoning. *QJM* 2006; 99(8): 513-22.
- 31.** Faiz MS, Mughal S, Memon AQ. Acute and late complications of organophosphate poisoning. *J Coll Physicians Surg Pak* 2011; 21(5): 288-90.
- 32.** Sungur M, Güven M. Intensive care management of organophosphate insecticide poisoning. *Crit Care* 2001; 5(4): 211-5.
- 33.** Mack RB. Toxic encounters of the dangerous kind. "Yes, Virginia, there is no tooth fairy"-clonidine poisoning. *N C Med J* 1983; 44(2): 99, 101-5.
- 34.** Mdaghri YA, Mossadeq A, Faroudy M, Sbihi A. Cardiac complications associated with organophosphate poisoning. *Ann Cardiol Angeiol (Paris)* 2010; 59(2): 114-7.

## Predictive Factors of Endotracheal Intubation in Poisoned Patients with Organophosphates

Nastaran Eizadi-Mood MD<sup>1</sup>, Matin Shariati MD<sup>2</sup>, Ahmad Yaraghi MD<sup>1</sup>, Farzad Gheshlaghi MD<sup>1</sup>, Gholamreza Masoomi MD<sup>3</sup>, Zahra Dana Siadat MD<sup>4</sup>

### Abstract

**Background:** Organophosphates poisoning (OP) is the forth common cause of poisoning and the second cause of death in poisoned patients in Isfahan referral poisoning center. Early diagnosis and appropriate management can reduce both, the complications and mortality. In this study, we determined the predictive factors of endotracheal intubation in patients poisoned by organophosphorus pesticides.

**Methods:** This was a descriptive analysis cross-sectional study. We collected the data of all poisoned patients referred to Noor and Ali Asghar hospital from 2009 June to 2010 October.

**Findings:** In the study period, 43 patients with organophosphate poisoning were evaluated. The prevalence of muscarinic, nicotinic and central nervous system manifestations were 88.4%, 44.2% and 39.5% respectively. Vomiting (55.8%), sialorrhea (41.9%), change in mental status (30.2%), miosis (23.3%), and diaphoresis (23.3%) were the most frequent signs respectively. Overall mortality rate was 13.1%. There was a significant difference in miosis, respiratory distress, bronchorhea, central nervous sign and changes in mental status, and abnormal chest auscultation in endotracheal intubate patients. More than 35 years of age, more than 90 mmHg of diastolic blood pressure, greater than 126 mg/dl blood sugar, change in mental status, abnormal chest auscultation, central nervous system sign, miosis, respiratory distress, and bronchorhea would predict requiring to intubation.

**Conclusion:** The found predicting factors can help emergency physicians to admit patients with organophosphates poisoning in the intensive care unit (ICU) to reduce mortality and morbidity.

**Keywords:** Organophosphate, Muscarinic, Nicotinic, Outcome.

<sup>1</sup> Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

<sup>2</sup> General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

<sup>3</sup> Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

<sup>4</sup> Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

**Corresponding Author:** Matin Shariati MD, Email: bbc\_on@yahoo.com