

بررسی فراوانی ژن‌های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در ایزوله‌های *Acinetobacter baumannii* جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

فاطمه امینی^۱, حسن علی کریم‌پور^۲, سیاوش وزیری^۳, مهدی قادری^۳, سعید محمدی^۳, محسن عزیزی^۱

مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: *Acinetobacter*, باکتری فرصت‌طلب و از عوامل ایجاد کننده عفونت‌های بیمارستانی است که دارای مقاومت آنتی‌بیوتیکی بالایی می‌باشد. این مطالعه، با هدف تعیین الگوهای مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی ژن‌های *aphA6* و *aadB* در *Acinetobacter baumannii* جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (Intensive care unit) یا ICU (Intensive care unit) انجام گرفت.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، ایزوله‌ی *Acinetobacter baumannii* از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه جمع‌آوری و با استفاده از روش‌های باکتری‌شناسی اختصاصی شناسایی شدند. برای شناسایی حساسیت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌ها از روش دیفیوژن (Disk diffusion) استفاده شد. برای شناسایی فراوانی ژن‌های *aphA6* و *aadB* از روش Polymerase chain reaction (PCR) با استفاده از پرایمرهای اختصاصی آن‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: در ایزوله‌های مورد بررسی، بیشترین مقاومت آنتی‌بیوتیکی در برابر تیکارسیلین (۸۷/۹ درصد) و سفتازیدیم (۸۶/۲ درصد) و کمترین مقاومت در پلی‌میکسین B (۱۲/۱ درصد) بود. از مجموع ۵۸ ایزوله‌ی *Acinetobacter*، ۳۶ مورد (۶۲/۱ درصد) ژن *aphA6* و ۹ مورد (۱۵/۵ درصد) ژن *aadB* را داشتند. همچنین، ۵ مورد (۸/۶ درصد) دارای هر دو ژن و ۱۸ نمونه (۳۱/۳ درصد) فاقد هر دو ژن بودند.

نتیجه‌گیری: ۸۰ درصد از ایزوله‌های *Acinetobacter* جدا شده، به آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی مقاومت نشان دادند. با توجه به میزان بالای مقاومت آنتی‌بیوتیکی نسبت به این دسته آنتی‌بیوتیک و اکثر آنتی‌بیوتیک‌های بررسی شده در این مطالعه، دقت در استفاده از آنتی‌بیوتیکی مانند پلی‌میکسین B برای درمان عفونت‌های ناشی از این پاتوژن ضروری به نظر می‌رسد.

وازگان کلیدی: *Acinetobacter*, مقاومت آنتی‌بیوتیکی، آمینوگلیکوزیدها

ارجاع: امینی فاطمه، کریم‌پور حسن علی، وزیری سیاوش، قادری مهدی، محمدی سعید، عزیزی محسن. بررسی فراوانی ژن‌های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در ایزوله‌های *Acinetobacter baumannii* جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه. مجله دانشکده پزشکی اصفهان ۱۳۹۵؛ ۳۴(۴۰۷): ۱۳۸۱-۱۳۸۸.

مقدمه

کوکوباسیل گرم منفی، غیر تخمیر کننده، فاقد *Acinetobacter* حرکت و اکسیداز منفی است که به دلیل نیازمندی‌های تغذیه‌ای پایین، توانایی رشد در اکثر منابع انسانی و محیطی را دارد. بیشترین میزان شیوع عفونت‌های حاصل از این باکتری در مناطق مرطوب و گرم است (۱-۲). در میان گونه‌های مختلف این باکتری، کمپلکس

A.calcoaceticus و *A.baumannii* تشكیل شده است، بیشترین عامل عفونت‌های حاصل از این باکتری را به خود اختصاص داده است (۳). این باکتری، می‌تواند باعث عفونت بیمارستانی، عفونت دستگاه ادراری، پنومونی، زخم‌های عفونی و منزه‌یت شود. *Acinetobacter* با وجود ویرولانس پایین، توانایی بالایی در ایجاد عفونت‌های بیمارستانی به خصوص در بخش‌های

- ۱- دستیار پژوهشی، کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
- ۲- استادیار، گروه بیهوده، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
- ۳- دانشیار، گروه بیماری‌های عفونی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
- ۴- کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

نویسنده‌ی مسؤول: محسن عزیزی

Email: .azizi9889@yahoo.com

دارای بیشترین شیوع است و عامل مقاومت به آمینوگلیکوزیدهایی از جمله جنتامایسین، آمیکاسین، کاتانامایسین، پارومومایسین و نئومایسین می‌باشد. گروه آنزیمی آمینوگلیکوزید نوکلئوتیدیل ترانسفراز، به ۵ گروه مختلف طبقه‌بندی شده‌اند. این آنزیم‌ها، حاصل از دفسفریلاسیون (AMP) Adenosine monophosphate ATP را به گروه هیدروکسیل موقعیت^{۲-۳-۴-۹} در ساختار آمینوگلیکوزید انتقال می‌دهد (۱۳-۱۴).

به علت شیوع بالای عفونت‌های بیمارستانی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه، بررسی میکروارگانیسم‌های مولد این عفونت‌ها و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در آن‌ها بسیار حائز اهمیت است. از این‌رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و تشخیص ملکولی ژن‌های aadB و aphA6 در نمونه‌های *Acinetobacter baumannii* جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام رضا (ع) در شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ انجام شد.

روش‌ها

در این مطالعه، تعداد ۳۲۰ نمونه‌ی بالینی مختلف (زخم، خون، خلط، ادرار، کاتر و سایر مایعات) جمع‌آوری شده از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۴، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها پس از جمع‌آوری و انتقال به آزمایشگاه، بر روی محیط کشت‌های agar Blood و McConkey agar کشت داده و در دمای ۴۲ درجه‌ی سانتی‌گراد انکوبه شدند. سپس، برای شناسایی *Acinetobacter baumannii*، از آزمون‌های استاندارد بیوشیمیایی شامل کاتالاز، اسیداز، عدم تخمیر Sulfid-indole-motility (SIM)، Triple-sugar-iron (TSI) و تولید پیگمان استفاده شد. در مجموع، تعداد ۵۸ ایزوله‌ی *Acinetobacter* مورد گردید. در این‌جا، تعداد ۵۱ blaOXA-51 با استفاده از روش Polymerase chain reaction (PCR) با استفاده از ژن blaOXA-51 مطابق سایر مطالعات استفاده گردید (۱۵). سپس، آزمون حساسیت آنتی‌بیوتیکی با استفاده از روش دیسک دیفیوژن (Disk diffusion) و با به کارگیری استاندارد ۰/۵ McFarland و مطابق با دستورالعمل‌های (CLSI 2010) Clinical and laboratory standards institute 2010 انجام گرفت (۱۶).

در ابتدا، باکتری‌های جدا شده بر روی محیط Muller-Hinton agar (شرکت های مادیا، هندوستان) کشت داده شد.

مراقبت ویژه، سوختگی و جراحی را دارد (۲-۵). این باکتری، می‌تواند در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) یا Intensive care unit موجود در این بخش زنده بماند که این مسئله، زمینه‌ی انتشار باکتری و ایجاد عفونت در این بیماران را فراهم می‌آورد (۶).

اهمیت بالینی این پاتوژن، به واسطه‌ی کسب سریع ژن‌های مقاومت به انواع فرابانی از آنتی‌بیوتیک‌ها است، که به همین علت، کنترل عفونت‌های ناشی از آن را پسیار دشوار کرده است (۷). بررسی‌ها نشان داده است که گونه‌های مقاوم به چند داروی (MDR) یا *Acinetobacter baumannii* به بیشتر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم شده‌اند (۸-۹). برای درمان عفونت‌های ناشی از *Acinetobacter*، از آنتی‌بیوتیک‌هایی مثل بتالاکتام‌ها، آمینوگلیکوزیدها و فلوروکینولون‌ها استفاده می‌شود، اما در سال‌های اخیر، به دلیل استفاده‌ی نامناسب و بی‌رویه از این آنتی‌بیوتیک‌ها، مقاومت نسبت به آن‌ها افزایش چشمگیری داشته است (۱۰).

مکانیسم‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی در *Acinetobacter baumannii* شامل تغییر آنزیمی، موتاسیون در ژن‌های هدف، تغییر نفوذپذیری غشای خارجی و افزایش بیان ایглаکس پمپ‌ها می‌باشد (۱۱-۱۲). در میان مکانیسم‌های مختلف مقاومت آنتی‌بیوتیکی در *Acinetobacter*، تغییر آنزیمی مهم‌ترین مکانیسم نسبت به آمینوگلیکوزیدها محسوب می‌شود. این مقاومت آنتی‌بیوتیکی، ناشی از حضور ژن‌هایی در باکتری به نام آنزیم‌های تغییر دهنده‌ی آمینوگلیکوزید (AMEs) یا Aminoglycoside modifying enzymes است. خانواده‌ی AMEs بر اساس نوع فعالیت آنزیمی به سه گروه اصلی آمینوگلیکوزید Aminoglycoside phosphotransferase (APH) یا AAC یا Aminoglycoside acetyltransferases و آمینوگلیکوزید نوکلئوتیدیل (Aminoglycoside adenylyltransferase AAD) یا AAD طبقه‌بندی شده است.

آنژیم‌های آمینوگلیکوزید فسفوترانسفراز، گروه هیدروکسیل موجود در ساختار آمینوگلیکوزیدها را با کمک (ATP) یا (Adenosine triphosphate) فسفریله می‌کند. تاکنون هفت گروه مختلف از این آنژیم‌ها شناسایی شده‌اند. بزرگ‌ترین گروه آنزیمی این خانواده، I-Aph(3')-I است که گروه هیدروکسیل آنتی‌بیوتیک را در موقعیت^۳ فسفوریله می‌کند. در این خانواده‌ی آنزیمی، ژن aphA6

جدول ۱. توالی نوکلوتیدی پرایمرهای مورد استفاده برای شناسایی *Acinetobacter baumannii* مولد ژن‌های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها

| نام ژن | وزن مخصوص (bp) | دماه اندیخت (C°) | توالی نوکلوتیدی پرایمرها (۳'-۵') | رفرنس |
|---------|----------------|------------------|--|-------|
| OXA-F | ۱۸۸ bp | ۵۳ | ۵-TAATGCTTGATCGGCCTG-۳' ۵-TGGATTGCACTTCATCTTG-۳' | ۱۷ |
| OXA-R | ۷۹۷ bp | ۵۵ | ۵-ATGAATTGCCAATATTATTC-۳' ۵-TCAATTCAATTCATCAAGTTTA-۳' | ۲۳ |
| aphA6-F | ۵۳۴ bp | ۵۵ | ۵-ATGGACACAAACGCAGGTCGC-۳' ۵-TTAGGCCGATATCGCGACC-۳' | ۲۳ |
| aphA6-R | | | | |
| aadB-F | | | | |
| aadB -R | | | | |

گرفت. $P < 0.05$ به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.


یافته‌ها

در این مطالعه، از مجموع ۳۲۴ نمونه بالینی مورد بررسی، ۵۸ ایزوله (۱۷/۹ درصد) *Acinetobacter baumannii* جدا شد. از این تعداد، ۳۱ نمونه (۵۳/۵ درصد) در مردان و ۲۷ نمونه (۴۶/۵ درصد) در زنان بود. میانگین سنی بیماران 39.81 ± 16.30 سال با دامنه ۱۴-۷۵ سال بود. نمونه‌ها از بیماران مبتلا به باکتریمی، عفونت‌های تنفسی (وابسته به ونتیلاتور و غیر وابسته به ونتیلاتور)، عفونت ادراری و عفونت مایع مغزی-نخاعی اخذ شدند. از این تعداد *Acinetobacter* جدا شده، ۳۹ نمونه (۶۷/۲ درصد) از خون، ۶ نمونه (۱۰/۳ درصد) از مایع مغزی-نخاعی، ۵ نمونه (۸/۶ درصد) از کاتر، ۳ نمونه (۵/۲ درصد) از تراشه، ۲ نمونه (۳/۵ درصد) از ادرار، ۲ نمونه (۳/۵ درصد) از مایع پلورال و ۱ نمونه (۱/۷ درصد) از خلط جداسازی شد. بر اساس نتایج جدول ۲، الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در ایزوله‌های *Acinetobacter baumannii* نشان داد که بیشترین مقاومت در برابر تیکارسیلین (۸۷/۹ درصد) و سفتازیدیم (۸۶/۲ درصد) و کمترین میزان مقاومت در برابر پلی‌میکسین B (۱۲/۱ درصد) بود. از مجموع ۵۸ ایزوله‌ی *Acinetobacter*، ۳۶ نمونه (۶۲/۱ درصد) دارای ژن *aphA6* و ۹ نمونه (۱۵/۵ درصد) دارای ژن *aadB* بودند.

برای بررسی حساسیت آنتی‌بیوتیکی این باکتری‌ها، از ۱۰ دیسک آنتی‌بیوتیکی (شرکت های مدیا، هندوستان) شامل جنتاماپسین، کاناپاپسین، توبراماپسین، تیکارسیلین، سفتازیدیم، کوتربیومکسازول، ایمی‌پنم، سپروفلوکساسین، پیراسیلین/تازوپاکتم و پلی‌میکسین B استفاده شد. سپس، قطر هاله‌ی عدم رشد، با خطکش اندازه‌گیری شد و با استفاده از جداول 2010 CLSI نتایج آن‌ها گزارش گردید. در این مطالعه، از سویه‌های استاندارد (ATCC19606) *Acinetobacter baumannii* و (ATCC25922) *Escherichia coli* در ادامه، برای شناسایی وجود ژن‌های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها به کمک پرایمرهای اختصاصی و طبق جدول ۱، واکنش PCR انجام شد. ابتدا کل محتوای ژنومی باکتری با استفاده از روش جوشاندن استخراج گردید. به این منظور، چندین کانی خالص باکتری در 0.5 ml لیتر آب مقطر استریل حل شد و پس از ۵ دقیقه جوشاندن و خنک شدن در مرحله‌ی بعد، در دور 8×7000 میلتی‌لیتری فیبروز شد. محلول رویی جهت انجام واکنش PCR به لوله‌های اپندورف جدید منتقل گردید و به عنوان DNA باکتری به کار رفت. برای واکنش PCR از Master mix (شرکت سینا کلون، ایران) استفاده شد. محصول PCR با استفاده از الکتروفورز و رنگ‌آمیزی با اتیدیوم بروماید، با دستگاه ژل داک مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون‌های *t* Independent و χ^2 در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی ۲۰ (version 20, SPSS Inc., Chicago, IL) مورد تجزیه و تحلیل قرار

جدول ۲. الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌های *Acinetobacter baumannii* جداسازی شده نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف با روش دیسک دیفیوژن

| آنتی‌بیوتیک | میزان مقاومت (درصد) | میزان حساسیت (درصد) | حساستیت حد وسط (درصد) | میزان حساسیت (درصد) |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| جنتاماپسین | ۴۵ (۷۶/۶) | ۲ (۳/۴) | ۱۱ (۱۹/۰) | ۶ (۱۰/۳) |
| کاناپاپسین | ۴۹ (۸۴/۵) | ۳ (۵/۲) | ۷ (۱۲/۱) | ۵ (۸/۶) |
| تیکارسیلین | ۵۱ (۸۷/۹) | ۰ (۰) | ۸ (۱۳/۸) | ۶ (۱۰/۳) |
| سفتازیدیم | ۵۰ (۸۶/۲) | ۳ (۵/۲) | ۶ (۱۰/۳) | ۵ (۸/۶) |
| توبراماپسین | ۴۶ (۷۹/۳) | ۴ (۶/۹) | ۶ (۱۰/۳) | ۸ (۱۳/۸) |
| سپروفلوکساسین | ۴۷ (۸۱) | ۵ (۸/۶) | ۶ (۱۰/۳) | ۷ (۱۲/۱) |
| کوتربیومکسازول | ۴۸ (۸۲/۸) | ۴ (۶/۹) | ۶ (۱۰/۳) | ۸ (۱۳/۸) |
| پیراسیلین/تازوپاکتم | ۴۶ (۷۹/۳) | ۵ (۸/۶) | ۷ (۱۲/۱) | ۵۱ (۸۷/۹) |
| ایمی‌پنم | ۴۸ (۸۲/۸) | ۲ (۳/۴) | | |
| پلی‌میکسین B | ۷ (۱۲/۱) | ۰ (۰) | | |



شکل ۱. نتایج PCR (Polymerase chain reaction) ژن‌های *aphA6* و *aadB* (PCR) فرابانی ژن‌های *aphA6* و *aadB* (PCR).
۱- نشانگر (100 bp)، ۲- شاهد مثبت (534 bp)، ۳- نمونه مثبت (534 bp)
۴- شاهد منفی (100 bp)، ۵- نشانگر (797 bp)، ۶- شاهد منفی (797 bp)

(از ۴۶ نمونه مقاوم به توبرامايسين ۳۵ نمونه واجد ژن *aphA6* بودند) و کاناامايسين ۷۳/۴ درصد (از ۴۹ نمونه مقاوم به کاناامايسين ۳۶ نمونه واجد ژن *aphA6* بودند) مشاهده گردید. همچنان، ژن *aadB* در نمونه‌های مقاوم به جنتامايسين ۲۰ درصد (از ۴۵ نمونه مقاوم به جنتامايسين ۴۹ نمونه واجد ژن *aadB* بودند)، کاناامايسين ۱۸/۳ درصد (از ۴۹ نمونه مقاوم به کاناامايسين ۹ نمونه واجد ژن *aadB* بودند) و توبرامايسين ۱۷/۳ درصد (از ۴۶ نمونه مقاوم به توبرامايسين ۸ نمونه واجد ژن *aadB* بودند) شناسايي گردید.

نتایج واکنش PCR هر دو ژن در شکل ۱ آمده است. همچنين، ۵ نمونه (۸/۶ درصد) دارای هر دو ژن *aphA6* و *aadB* و نيز ۱۸ نمونه (۳۱/۰ درصد) قادر هر کدام از دو ژن مورد بررسی بودند. نتایج حاصل از فرابانی ژن‌های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در ايزوله‌های *Acinetobacter* دارای مقاومت به آنتىبيوتيك‌های مورد بررسی در جدول ۳ آمده است. از مجموع ۵۸ ايزوله‌ی *Acinetobacter baumannii* ژن *aphA6* در نمونه‌های مقاوم به جنتامايسين، ۳۶ نمونه واجد ژن *aphA6* (از ۴۵ نمونه مقاوم به جنتامايسين، ۷۶/۰۸ درصد

جدول ۳. فرابانی ژن‌های کد کننده مقاومت به آمینوگلیکوزیدهای جدا شده از ايزوله‌های *Acinetobacter baumannii* به نسبت الگوهای حساسیت آنتىبيوتيك مختلف

| (۱) <i>aadB</i> | | | (۳۶) <i>aphA6</i> | | | آنتىبيوتيك‌ها | |
|-----------------|---|---|-------------------|---|----|---------------------|--|
| S | I | R | S | I | R | | |
| . | . | ۹ | . | . | ۲۶ | جنتامايسين | |
| . | . | ۹ | . | . | ۳۶ | کاناامايسين | |
| . | . | ۹ | . | . | ۳۶ | تيكارسيلين | |
| . | . | ۹ | ۴ | ۲ | ۳۰ | سفتايزيديم | |
| . | ۱ | ۸ | ۰ | ۱ | ۳۵ | توبرامايسين | |
| ۲ | ۱ | ۶ | ۴ | ۱ | ۳۱ | سيپروفلوكساسين | |
| ۲ | . | ۷ | ۳ | ۲ | ۳۱ | کوتريموکسازول | |
| . | ۱ | ۸ | ۵ | ۱ | ۲۰ | پيراسيلين/تازوباكتم | |
| . | . | ۹ | ۵ | ۰ | ۳۱ | ایهي‌پنم | |
| ۶ | . | ۳ | ۳۲ | . | ۴ | پلی‌میکسین B | |

عفونت‌های این باکتری محسوب می‌شود که این امر، نیازمند توجه و دقت بیشتری در زمینه‌ی تجویز آن را خاطرنشان می‌کند. در این مطالعه، فراوانی ژن‌های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در نمونه‌های *Acinetobacter baumannii* برای ژن‌های *aphA6* و *aphB* ۶۲/۱ درصد بود.

در اکثر مطالعات انجام گرفته، بیشترین شیوع در ژن‌های *aphA6* آمینوگلیکوزید در *Acinetobacter baumannii* در ژن *aphA6* گزارش شده است که نتایج مطالعه‌ی حاضر با آن‌ها همخوانی دارد. در این مطالعه، به ترتیب ۸۰/۰ درصد و ۷۳/۴ درصد از ایزوله‌های *Acinetobacter* دارای ژن *aphA6*، به جنتامايسین و کانامایسین مقاوم بودند. همچنین، ۷۰/۵ درصد از انساع *Acinetobacter* دارای ژن *aphA6* نسبت به تیکارسیلین مقاومت نشان دادند. حدود ۶۶ درصد از ایزوله‌های مورد بررسی دارای ژن *aphA6* نسبت به سیپروفلوکساسین مقاومت داشتند. در ۵ نمونه (۸/۶ درصد) از ایزوله‌های مورد بررسی هر دو ژن *aphA6* و *aadB* شناسایی شد.

در پژوهش فراهانی خلست‌آبادی و همکاران، فراوانی *Acinetobacter baumannii* درصد گزارش شد که نسبت به نتایج مطالعه‌ی حاضر شیوع بیشتری داشت (۲۷)، اما علی‌اکبرزاده و همکاران این شیوع را ۹/۷ درصد به دست آوردنده که با یافه‌های این مطالعه هم‌خوانی داشت (۲۲). نتایج این پژوهش نشان داد که بیش از ۸۰ درصد از ایزوله‌های مورد بررسی، نسبت به آمینوگلیکوزیدها مقاومت بالایی مشاهده شد. همچنین، میزان شیوع بالایی در ژن‌های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها مشاهده شد که این امر، می‌تواند نشان دهنده‌ی استفاده‌ی نادرست و غیر منطقی از این آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان عفونت‌های باکتریال باشد. از طرفی، ۸۷/۹ درصد از ایزوله‌ها در برابر پلی‌میکسین B حساسیت نشان دادند. این امر، حاکی از این است که می‌توان این آنتی‌بیوتیک را همچنان از جمله داروهای مؤثر در درمان عفونت‌های حاصل از این باکتری محسوب کرد. در نتیجه، لازم است در امر تجویز و استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان عفونت‌های باکتریایی توجه بیشتری معطوف گردد.

تشکر و قدردانی

مطالعه‌ی حاضر، حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با شماره‌ی ثبت ۹۴۳۵۳ بود که با حمایت مالی این دانشگاه انجام شد. بدین وسیله، از همکاران محترم آزمایشگاه مرکز تحقیقات و همچنین، معاونت پژوهش و فن‌آوری این دانشگاه سپاسگزاری می‌گردد.

بحث

به طور کلی، عفونت‌های مقاوم به درمان ناشی از *Acinetobacter baumannii* در بخش مراقبت‌های ویژه رو به افزایش می‌باشد که این امر، به دلایلی همچون بستری طولانی مدت در بیمارستان، نقص ایمنی، اعمال جراحی، تماس طولانی با بیماران کلونیزه شده، سوختگی، کهولت سن، مصرف زیاد عوامل آنتی‌باکتریال وسیع الطیف و وجود وسایل تهاجمی مثل کاتتر اتفاق می‌افتد که زمینه‌ساز ایجاد عفونت بیشتر و کلونیزه شدن پاتوژن‌ها در بیماران بستری در این بخش می‌شود و در نهایت، شکست درمان‌های آنتی‌بیوتیکی متداول را در پی دارد (۱۰، ۱۷-۱۹). در مطالعه‌ی حاضر، نمونه‌های جمع‌آوری شده از بخش مراقبت‌های ویژه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج مطالعه نشان داد که ایزوله‌های موجود در ICU نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های رایج مقاومت بالایی را نشان دادند که هم‌سو با نتایج سایر مطالعات بود (۲۰).

بیشترین فراوانی *Acinetobacter baumannii* در نمونه‌های مورد بررسی مربوط به نمونه‌های خون است که از این نظر، با نتایج سایر مطالعات سازگار بود (۲۱). آمینوگلیکوزیدها از جمله آنتی‌بیوتیک‌های پرکاربرد در درمان انساع عفونت‌های باکتریال محسوب می‌شوند، اما در مطالعات اخیر، میزان بالایی از مقاومت به *Acinetobacter baumannii* این دسته‌ی دارویی به خصوص در گزارش شده است. در مطالعه‌ی حاضر، حدود ۷۵ درصد از ایزوله‌های *Acinetobacter baumannii* مورد بررسی، دارای مقاومت سطح بالایی به آنتی‌بیوتیک‌های مورد بررسی بودند. در مطالعه‌ی حاضر، مقاومت به آمینوگلیکوزیدها برای آنتی‌بیوتیک‌های کانامایسین ۸۴/۵ درصد، توبرامایسین ۷۹/۳ درصد و جنتامايسین ۷۷/۶ درصد مشاهده گردید. در مطالعه‌ی علی‌اکبرزاده و همکاران، میزان مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در *Acinetobacter* در برایر کانامایسین، جنتامايسین و توبرامایسین به ترتیب ۹۴، ۸۶ و ۶۳ درصد گزارش شد (۲۲). میزان مقاومت نسبت به کانامایسین و جنتامايسین هم‌سو با این مطالعه و سایر مطالعات می‌باشد، اما میزان مقاومت نسبت به توبرامایسین در مطالعه‌ی حاضر نسبت به این پژوهش و اکثر پژوهش‌های دیگر که در کشور انجام گرفته، بیشترین حساسیت آنتی‌بیوتیکی در ایزوله‌های *Acinetobacter baumannii* نسبت به پلی‌میکسین B گزارش شده است. در این مطالعات، میزان مقاومت به پلی‌میکسین B بین ۳/۱۳-۱۶ درصد تعیین شده است که با میزان مقاومت گزارش شده نسبت به پلی‌میکسین B (۱۲/۱ درصد) در مطالعه‌ی حاضر هم‌خوانی داشت (۲۲-۲۳، ۲۶). در نتیجه، می‌توان گفت در حال حاضر، پلی‌میکسین B همچنان دارویی مؤثر در درمان

References

1. Ghajavand H, Havaei A, Nasr Esfahani B, Fazeli H, Moghim S. Frequency of multi drug resistance *acinetobacter baumannii* isolates in intensive care units (ICU) of Isfahan hospitals, Iran, via molecular method and their antimicrobial resistance patterns. *J Isfahan Med Sch* 2014; 32(295): 1175-85. [In Persian].
2. Babay HA, Kambal AM, Al-Anazy AR, Saidu AB, Aziz S. *Acinetobacter* blood stream infection in a teaching hospital- Riyadh, Saudi Arabia. *Kuwait Med J* 2003; 35(3): 196-201.
3. Bendinelli M, Friedman H, Bergogne-Bérezin E. *Acinetobacter* biology and pathogenesis. New York, NY: Springer; 2008. p. 1, 14, 120-4.
4. Yousefian R, Karbasizade V, Moghim S. Identification and frequency of colistin-resistant *Acinetobacter baumanii* in clinical isolates using polymerase chain reaction. *J Isfahan Med Sch* 2014; 32(301): 1466-74. [In Persian].
5. Valentine SC, Contreras D, Tan S, Real LJ, Chu S, Xu HH. Phenotypic and molecular characterization of *Acinetobacter baumannii* clinical isolates from nosocomial outbreaks in Los Angeles County, California. *J Clin Microbiol* 2008; 46(8): 2499-507.
6. Chiu CH, Lee HY, Tseng LY, Chen CL, Chia JH, Su LH, et al. Mechanisms of resistance to ciprofloxacin, ampicillin/sulbactam and imipenem in *Acinetobacter baumannii* clinical isolates in Taiwan. *Int J Antimicrob Agents* 2010; 35(4): 382-6.
7. Hujer KM, Hujer AM, Hulten EA, Bajaksouzian S, Adams JM, Donskey CJ, et al. Analysis of antibiotic resistance genes in multidrug-resistant *Acinetobacter* sp. isolates from military and civilian patients treated at the Walter Reed Army Medical Center. *Antimicrob Agents Chemother* 2006; 50(12): 4114-23.
8. Jafari R, Karbasizade V, Moghim Sh. Frequency and resistance patterns of bacterial isolates from burn wounds infections in Isfahan, Iran. *J Isfahan Med Sch* 2013; 31(246): 1134-40. [In Persian].
9. Nemec A. Multidrug resistant *Acinetobacter baumannii*. *Klin Mikrobiol Infekc Lek* 2008; 14(5): 162-7. [In Czech].
10. Fournier PE, Richet H. The epidemiology and control of *Acinetobacter baumannii* in health care facilities. *Clin Infect Dis* 2006; 42(5): 692-9.
11. Poirel L, Nordmann P. Carbapenem resistance in *Acinetobacter baumannii*: mechanisms and epidemiology. *Clin Microbiol Infect* 2006; 12(9): 826-36.
12. Khaledi A, Bahador A, Mansoori NM, Ghazali Bina M, Ghazvini K. Determination of antimicrobial resistance pattern of *Acinetobacter baumanii* isolated from patients in intensive care unit (ICU). *Med J Mashad Univ Med Sci* 2015; 58(7): 376-80.
13. Nemec A, Dolzani L, Brisson S, van den Broek P, Dijkshoorn L. Diversity of aminoglycoside-resistance genes and their association with class 1 integrons among strains of pan-European *Acinetobacter baumannii* clones. *J Med Microbiol* 2004; 53(Pt 12): 1233-40.
14. Aliakbarzade K, Farajnia S, Kariminik A. Prevalence of aminoglycoside resistance genes in *acinetobacter baumannii* isolates from patients In Tabriz city. *Journal of Microbial World* 2013; 3(16): 219-27. [In Persian].
15. Turton JF, Gabriel SN, Valderrey C, Kaufmann ME, Pitt TL. Use of sequence-based typing and multiplex PCR to identify clonal lineages of outbreak strains of *Acinetobacter baumannii*. *Clin Microbiol Infect* 2007; 13(8): 807-15.
16. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance standards for antimicrobial disk susceptibility testing; 20th informational supplement. CLSI/NCCLS M100-S20. Wayne, PA: CLSI; 2010.
17. Gutierrez O, Juan C, Cercenado E, Navarro F, Bouza E, Coll P, et al. Molecular epidemiology and mechanisms of carbapenem resistance in *Pseudomonas aeruginosa* isolates from Spanish hospitals. *Antimicrob Agents Chemother* 2007; 51(12): 4329-35.
18. Fazeli H, Vakili B, Khorvash F, Shoaei P, Kariminik A, Yaran M, et al. Identification of mutation in *gyrA* gene obtained from quinolone resistant clinical isolates of *Acinetobacter baumannii*. *Journal of Microbial World* 2014; 7(2): 109-17. [In Persian].
19. Mohammad Taheri Z, Pourpaki M, Mohammadi F, Namdar R, Masjedi MR. Surveillance of antimicrobial susceptibility among bacterial isolates from intensive care unit patients of a tertiary-care university hospital in Iran: 2006-2009. *Chemotherapy* 2010; 56(6): 478-84.
20. Shakibaie MR, Adeli S, Salehi MH. Antibiotic resistance patterns and extended-spectrum beta-lactamase production among *Acinetobacter* spp. isolated from an intensive care Unit of a hospital in Kerman, Iran. *Antimicrob Resist Infect Control* 2012; 1(1): 1.
21. Moniri R, Farahani RK, Shajari G, Shirazi MN, Ghasemi A. Molecular epidemiology of aminoglycosides resistance in *acinetobacter* spp. With emergence of multidrug-resistant strains. *Iran J Public Health* 2010; 39(2): 63-8.
22. Aliakbarzade K, Farajnia S, Karimi NA, Zarei F, Tanomand A. Prevalence of Aminoglycoside Resistance Genes in *Acinetobacter baumannii* Isolates. *Jundishapur J Microbiol* 2014; 7(10): e11924.
23. Khodadadi S, Kiani AH, Pournajafand A, Ardebil A. High prevalence of aminoglycoside resistance among *Acinetobacter baumannii* isolated from a teaching hospital in Tehran, Iran. *International Journal of Development Research* 2014; 4(11): 2498-502.
24. Owlia P, Azimi L, Gholami A, Asghari B, Lari AR. ESBL- and MBL-mediated resistance in *Acinetobacter baumannii*: a global threat to burn patients. *Infez Med* 2012; 20(3): 182-7.
25. Kiani S, Momtaz H, Serajian AA, Tajbakhsh E. Detection of integrons in *Acinetobacter baumannii* strains isolated from the nosocomial infections of Ahvaz city and their relation with the resistance pattern. *International Journal of Medical Laboratory* 2016; 3(1): 50-63.

26. Lin T, Tang CG, Li QH, Ji J, Ge HY, Zhang XY, et al. Identification of aac(2')-I type b aminoglycoside-modifying enzyme genes in resistant *Acinetobacter baumannii*. *Genet Mol Res* 2015; 14(1): 1828-35.
27. Farahani Khelatabadi R, Moniri R, Shajari GR, Nazem Shirazi MH, Musavi SGA, Ghasemi A, et al . Antimicrobial susceptibility patterns and the distribution of resistance genes among *Acinetobacter* species isolated from patients in Shahid Beheshti hospital, Kashan. *Feyz* 2009; 12(4): 61-7. [In Persian].

Prevalence Study of Aminoglycoside-Resistance Genes in *Acinetobacter baumannii* Isolated from the Patients in Intensive Care Unit

Fatemeh Amini¹, Hassan Ali Karimpour², Siavash Vaziri³, Mehdi Ghaderi⁴,
Saeed Mohammadi², Mohsen Azizi¹

Original Article

Abstract

Background: *Acinetobacter baumannii* is a highly antibiotic-resistant nosocomial opportunistic pathogen possess. This study aimed to assess the antibiotic-resistance pattern and detect the molecular frequency of *aphA6* and *aadB* genes in *Acinetobacter baumannii* isolated from patients in intensive care unit (ICU).

Methods: In this cross-sectional study, 58 *Acinetobacter baumannii* isolates collected from ICU patients in Imam Reza hospital, Kermanshah, Iran, were confirmed using standard bacteriological tests. Disc diffusion method was deployed for screening resistant isolates. The prevalence of *aphA6* and *aadB* genes was assessed using polymerase chain reaction (PCR) method with specific primers.

Findings: The highest antibiotic resistance rates were seen in ticarcillin (87.9%) and ceftazidime (86.2%) and the lowest was of polymyxin B (12.1%). Of 58 *Acinetobacter* isolates, 36 (62.1%) and 9 (15.5%) harbored *aphA6* and *aadB* genes, respectively. In addition, 5 isolates (8.6%) harbored both genes and 18 isolates (31.3%) were negative for any of those genes.

Conclusion: 80% of *Acinetobacter* isolates showed resistance to aminoglycoside antibiotics. Considering the high rates of antibiotic resistance to this category and other investigated antibiotics in this study, it seems necessary to precise on the use of antibiotics such as polymyxin B to treat the infections caused by this pathogen.

Keywords: *Acinetobacter baumannii*, Antibiotic resistance, Aminoglycosides

Citation: Amini F, Karimpour HA, Vaziri S, Ghaderi M, Mohamadi S, Azizi M. Prevalence Study of Aminoglycoside-Resistance Genes in *Acinetobacter baumannii* Isolated from the Patients in Intensive Care Unit. J Isfahan Med Sch 2017; 34(407): 1381-8.

1- Research Assistant, Department of Microbiology, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

2- Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

3- Associate Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

4- Department of Microbiology, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

Corresponding Author: Mohsen Azizi, Email: m.azizi9889@yahoo.com