

شناسایی ایزوله‌های بالینی مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکلوزیس شایع اصفهان با روش rpoB ژن PCR-RFLP Analysis

شیما هادی‌فر^۱، دکتر شراره مقیم^۲، دکتر حاجیه قاسمیان صفائی^۳، دکتر حسین فاضلی^۴،
دکتر فریبا فرید^۵، محسن موقوفه‌یی^۱، منصور صدیقی^۱، دکتر بهرام نصر اصفهانی^{۶*}

مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه: مطالعه جهت تشخیص جنس مایکوباکتریوم، معیاری را برای بررسی اپیدمیولوژی و پاتوزن این گروه از باکتری‌ها در نواحی جغرافیایی مختلف فراهم می‌کند. با توجه به شیوع عفونت‌های ناشی از مایکوباکتریوم در ایران و همچنین همسایگی ایران با دو کشور افغانستان و پاکستان که در زمرة High burden می‌گردد. در این مطالعه ابتدا عفونت‌های مایکوباکتریوم در ایران تحت تأثیر دو آنزیم (MspI و HaeIII) با استفاده از Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism analysis (PCR-RFLP analysis) مطالعه شد. در این مطالعه ۲۲ کشور از پیش به این بیماری و ارایه مولکولار اپیدمیولوژی بیماری‌های مایکوباکتریال روش PCR-RFLP analysis (PRA) می‌گردد. این روش دقیق و ارزان می‌باشد که تشخیص گونه‌های مایکوباکتریوم را فراهم می‌آورد. این مطالعه با هدف تعیین پروفایل قطعات محدود شونده با استفاده از روش پیش‌گفته برای مشخص نمودن تایپ‌های شایع مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکلوزیس اصفهان انجام گردید.

روش‌ها: ۳۴ ایزوله‌ی بالینی پس از گردآوری و کشت توسط روش فتوتیپی تشخیص داده شدند. یک قطعه‌ی ۳۶۰ bp از ژن rpoB با روش PCR (Polymerase chain reaction) تکثیر گردید و سپس محصولات PCR تحت تأثیر دو آنزیم (MspI و Moraxella sp.) و (HaeIII) قرار گرفتند. قطعات حاصل از هضم توسط آنزیم با استفاده از ژل متافور آکارز ۴ درصد الکتروفورز شدند و مورد آنالیز قرار گرفتند.

یافته‌ها: در بین ۳۴ گونه NTM (Nontuberculous mycobacteria) مورد بررسی تایپ I مایکوباکتریوم فورچیتوم با فراوانی ۸۲/۳۵ درصد بیشترین نمونه‌ی جدا شده از مجموعه‌ی نمونه‌های بالینی این منطقه بود و پس از آن، مایکوباکتریوم کانزاوی تایپ I و مایکوباکتریوم گوردونه تایپ I هر دو با ۵/۸۸ درصد و مایکوباکتریوم گوردونه تایپ II و مایکوباکتریوم اینتراسولار با ۲/۹۴ درصد جدا گردیدند.

نتیجه‌گیری: روش rpoB gene PRA به کار گرفته شده تشخیص گونه‌های مایکوباکتریوم، نتایج معتبری را با توجه به نتایج دیگر مطالعات، در این منطقه‌ی جغرافیایی ارایه نمود. الگوی PRA گونه‌های مایکوباکتریوم کانزاوی ساب تایپ I (MspI: ۳۰/۴۰، HaeIII: ۹۰/۲۰۵) و مایکوباکتریوم اویوم (HeaIII: ۲۷۰، MspI: ۴۰/۸۰، HaeIII: ۱۰۵) حاصل از این مطالعه با الگوی به دست آمده از بعضی مطالعات، یکسان بود؛ اما با پروفایل تعدادی دیگر همسان نبود. این روش، توانست ۱۰۰ درصد ایزوله‌های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس را شناسایی کند.

وازگان کلیدی: ژن rpoB، PRA، مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس

ارجاع: هادی‌فر شیما، مقیم شراره، قاسمیان صفائی حاجیه، فاضلی حسین، فرید فریبا، موقوفه‌یی محسن، صدیقی منصور، نصر اصفهانی بهرام. شناسایی ایزوله‌های بالینی مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکلوزیس شایع اصفهان با روش PCR-RFLP Analysis ژن rpoB. مجله دانشکده پزشکی اصفهان ۱۳۹۲؛ ۳۱(۲۶۶): ۲۱۳۸-۲۱۳۱.

* این مقاله هاصل پایان‌نامه‌ی دوهدی کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.

- ۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی و کیمی‌ی تحقیقات داشتجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۲- استادیار، مرکز تحقیقات عفونت‌های بیمارستانی و گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۳- دانشیار، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۴- استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرم‌سیری و گروه میکروب‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
- ۵- پزشک عمومی، مرکز سل استان، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

نویسنده‌ی مسؤول: دکتر بهرام نصر اصفهانی

Email: nasr@hlth.mui.ac.ir

درمانی متفاوتی را لازم داشته باشد، می‌تواند در اتخاذ روش‌های مناسب کنترل و درمان در هر منطقه توسط پزشکان مؤثر باشد (۶). روش‌های رایج فنوتیپی جهت شناسایی این گروه از باکتری‌ها، دارای محدودیت‌هایی از جمله زمان بر بودن و پاسخ‌های نه چندان دقیق می‌باشد (۷).

امروزه، تکنیک‌های مولکولی ابزارهای تشخیصی نوین را جهت تشخیص باکتری‌ها فراهم نموده است (۸). در بین روش‌های مولکولی موجود، روش‌های بر پایه‌ی Polymerase chain reaction (PCR) برای تشخیص NTM‌ها مناسب‌تر و قابل اعتمادتر می‌باشند (۹). ژنهای زیادی از جمله rpoB (۱۰)، ۱۶srRNA (۱۱)، dnaj (۱۲) و hsp65 (۱۳) با هدف شناسایی مورد استفاده قرار می‌گیرند (۹-۱۰). در این بین، ژن rpoB کد کنده‌ی زیر واحد β -آنزیم RNA پلیمراز به عنوان یک ژن مناسب برای تشخیص باکتری‌ها به ویژه باکتری‌هایی که ارتباطات بسیار نزدیک و تنوع بین گونه‌های محدود دارند، مطرح می‌باشد (۱۱).

روش PCR-RFLP analysis (PRA) یا Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism analysis (PCR-RFLP) یک روش دقیق و ارزان است که جهت شناسایی این گروه از باکتری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (۱۱). با توجه به این که پروفایل قطعات محدود شونده‌ی ایزوله‌های مایکوباکتریوم در برخی نقاط جهان تعیین شده است و با توجه به مشکلات فراوانی که در مورد مایکوباکتریوم‌های آتیپیک از نظر پاتوتزینیکی، اپیدمیولوژیکی، درمان و مقاومت دارویی وجود دارد و در کشور ایران نیز این باکتری‌ها به صورت گستردۀ از منابع محیطی، حیوانی و انسانی جدا شده است،

مقدمه

مایکوباکتریوم‌ها یک گروه از باکتری‌ها هستند که از نظر ویژگی‌های ژنوتیپی و بیماری‌های مرتبط هتروژنوس می‌باشند. این ارگانیسم‌ها می‌توانند موجب افزایش حساسیت، پنومونی، آسم، برونشیت، عفونت پوست، زخم‌ها و غدد شوند. همچنین، این عفونت‌ها تهدید جدی برای بیماران فیبروز کیستیک محسوب می‌شوند (۱). امروزه به دلیل ایترکشن زیاد انسان با محیط‌های گوناگون و همچنین افزایش HIV بیماران مبتلا به نقایص ایمنی به علت ویروس (Human immunodeficiency virus) و بیماری ایدز، بیماری زمینه‌ای، سرطان‌ها و در پی آن رادیوتراپی و کموتراپی، عفونت‌های مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکلوزیس (NTM) یا Nontuberculous mycobacteria (NTM) به شدت افزایش یافته است (۲-۳).

NTM‌ها در محیط‌های طبیعی در سراسر جهان یافت می‌شوند و بیش از ۱۲۵ گونه‌ی مختلف را شامل می‌شوند و طیف وسیعی از بیماری‌ها را ایجاد می‌کنند (۴). با توجه به این موارد، به نظر می‌رسد شناسایی و تشخیص کلینیکی و درمان عفونت‌های NTM تبدیل به یک چالش برای کلینیسین‌ها شده است (۵). به منظور مقابله با این چالش و با توجه به افزایش تنوع بین مایکوباکتریوم‌ها، استفاده از روش‌های فنوتیپی به تنها ی ممکن است با هدف شناسایی این گروه از باکتری‌ها کافی نباشد و راه‌های مناسب‌تری برای شناسایی بایستی مورد توجه قرار گیرد. ضمن آن که آگاهی از چگونگی پراکنش این باکتری‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف و تایپ‌های مختلف مولکولی آن که ممکن است استراتژی‌های

آریل سولفاتاز- هیدرولیز Tween ۸۰ و دیگر آزمایش‌های فنوتیپیک) از یکدیگر افتراق داده شدند.

استخراج DNA

کشت تازه‌ی باکتری‌ها روی محیط ۷H۱۰ تهیه گردید و جداسازی DNA باکتری‌های مورد مطالعه با استفاده از روش سیتیل تری متیل آمونیوم بروماید (Cetyl trimethylammonium bromide CTAB) یا (Cetyl trimethylammonium bromide CTAB) صورت پذیرفت.

PCR

به منظور PCR منطقه‌ی ۳۶۰ bp از ژن rpoB (باز ۹۰۲ تا ۱۲۶۱) با استفاده از پرایمرهای:

-۳' (RPO5'-)

Forward : ۵'-TCAAGGAGAACGCTACG
-۳' (RPO3'-)

Reverse : ۵'-GGATGTTGATCAGGGTCTGC
تکثیر قطعه‌ی مورد نظر در حجم نهایی ۲۵ میکرولیتر می‌باشد که حاوی:

۲ میکرولیتر از DNA سوپرناکت (5ng genomic DNA)
۱µl of each prime (۱۰ pmol/ml)

۱/۲۵ µl MgCl₂ (۱/۵ mM)

۰/۵ µl dNTP (۲۰۰ mM)

۰/۲۵ µl Taq polymerase (۵۰۰ U)

۲/۵ µl ۱۰X Buffer

سپس Denaturation اولیه در ۹۴ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۵ دقیقه و ادامه‌ی سیکل شامل ۳۵ سیکل Denaturation در ۹۴ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۱ دقیقه، Annealing در ۶۰ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۱ دقیقه، Extention در ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۱ دقیقه و

شناسایی این گروه از باکتری‌ها با استفاده از PRA ژن rpoB جهت مشخص نمودن پروفایل قطعات طولی محدود شونده و ارایه‌ی اطلاعات مرتبط با اپیدمیولوژی و پایه‌های ژنتیکی این منطقه‌ی جغرافیایی انجام پذیرفت.

روش‌ها

سویه‌های باکتریایی

در این مطالعه ۳۴ ایزوله‌ی مختلف از مراکز مختلف آزمایشگاهی از جمله کلکسیون مایکوباکتریوم گروه میکروب‌شناسی دانشکده‌ی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز سل استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. این ایزوله‌ها در جدول ۱ لیست شده‌اند.

جدول ۱. گونه‌های باکتریایی مورد استفاده در این مطالعه

گونه	سویه
ATCC49403	مایکوباکتریوم فورچنیوم
۲۷	مایکوباکتریوم فورچنیوم ایزوله‌ی بالینی
۲	مایکوباکتریوم کانزارسی ایزوله‌ی بالینی
۱	مایکوباکتریوم ایتراسلولار ایزوله‌ی بالینی
۳	مایکوباکتریوم گوردونه ایزوله‌ی بالینی

آزمایش‌های فنوتیپی

نمونه‌ها روی محیط لوون اشتاین جانسون جهت رشد و بررسی مورفولوژی کلنی کشت داده شد و به مدت ۳ روز تا ۸ هفته در دمای ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد با ۵-۱۰ درصد CO₂ انکوبه گردید. گونه‌های مختلف مایکوباکتریوم با توجه به ظاهر کلنی، مدت رشد و آزمایش‌های بیوشیمیایی (تولید نیاسین، احیای نیترات، آزمایش کاتالاز در ۶۸ درجه‌ی سانتی‌گراد و آزمایش کاتالاز نیمه کمی- هیدرولیز

در بین ایزوله‌های دارای رشد سریع شناسایی شده بر اساس پروفایل قطعات محدود شونده حاصل از PRA ژن *mpoB* ۲۸ مورد مایکوباکتریوم فورچیتیوم ساب تایپ I بودند و در بین ایزوله‌های دارای رشد کند، ۱ مورد م.ایتراسلولار تایپ I، ۲ مورد M.کانزاسی ساب تایپ I و ۳ مورد M.گوردونه (۲ مورد آن ساب تایپ I و ۱ مورد ساب تایپ II) بودند. پروفایل حاصل از آنالیز قطعات طولی محدود شونده ایزوله‌های مورد مطالعه در جدول ۲ لیست شده است.

بحث

تشخیص کلینیکی و درمان عفونت‌های NTM تبدیل به یک چالش برای کلینیسین‌ها شده است (۵). همچنین با توجه به انتشار بیماری ایدز در سراسر دنیا عفونت با NTM مانند TB (Tuberculosis) در بسیاری از قسمت‌های جهان بیش از دهه‌های گذشته افزایش یافته است (۱۲). مطالعه جهت تشخیص جنس مایکوباکتریوم در سطح تایپ و حتی ساب تایپ، معیاری را برای بررسی اپیدمیولوژی و پاتوژنی این گروه از باکتری‌ها فراهم می‌کند (۱۳). همچنین امکان یک مسیر تشخیصی و درمانی موفق را میسر می‌سازد (۵).

نهایی در ۷۲ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۷ دقیقه انجام شد. جهت تأیید تولید محصول مورد نظر طی فرایند PCR، بخشی از محصول روی ژل آگارز، الکتروفورز شد.

RFLP

۱۴ میکرولیتر محصول PCR در حجم نهایی ۲۰ μl - حاوی ۲ μl بافر ۱۰x، ۳/۵ μl DH₂ Enzyme uMspI Enzyme ۳/۵ μl Loading buffer اضافه ۵-۵ در ۳۷ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۴ ساعت انکوبه شد. سپس ۴ μl از Loading buffer اضافه گردید و نمونه‌ها روی ۴ درصد متافور آگارز الکتروفورز شدند. سپس اندازه‌ی قطعات تعیین ۵ گردید. مراحل ذکر شده به صورت مشابه برای U ۴ از Hae III Enzyme نیز انجام شد. ۱ μl از Loading buffer اضافه و نمونه‌ها روی ۴ درصد متافور آگارز الکتروفورز شدند. سپس اندازه‌ی قطعات تعیین گردید.

یافته‌ها

با روش فنوتایپیک هر ۳۴ ایزوله‌ی مورد بررسی به عنوان NTM شناسایی شدند. از بین ۳۴ ایزوله‌ی مورد بررسی در این مطالعه با روش PRA، ۲۸ ایزوله‌ی متعلق به ایزوله‌ی NTM دارای رشد سریع و ۷ ایزوله‌ی NTM دارای رشد کند بودند.

جدول ۲. پروفایل قطعات طولی محدود شونده ایزوله‌های مایکوباکتریوم

ایزوله‌ها		ایزو	له‌ها
کلیوی قطعات طولی محدود شونده		کلیوی	
HeaIII	MspI		
۱۲۰/۹۰/۸۰	۱۷۵/۱۰۵/۷۰	مايكوباكتريوم فورچيتوم ساب تايپ I	
۲۱۰/۹۸/۹۰	۱۴۵/۹۵/۴۰/۳۰	مايكوباكتريوم گوردونه ساب تايپ I	
۳۳۰	۱۴۵/۱۰۰/۴۰	مايكوباكتريوم گوردونه ساب تايپ II	
۲۰۵/۹۰	۱۷۵/۶۰/۴۰/۳۰	مايكوباكتريوم كانزاسي ساب تايپ I	
۱۸۰/۹۰	۱۷۵/۱۰۵/۸۰	مايكوباكتريوم اينتراسلولار ساب تايپ I	

MspI: *Moraxella sp.*; HeaIII: *Haemophilus aegyptius* bacteria

آنالیز فیلوجنتیک و تشخیص باکتری‌ها به ویژه باکتری‌هایی که ارتباطات بسیار نزدیک و تنوع بین گونه‌ای محدود دارند، مطرح می‌باشد (۱۱).

با توجه به مشکلات فراوانی که در مورد مایکوباکتریوم‌های آتیپیک از نظر پاتوژنیته، اپیدمیولوژیک، درمان و مقاومت دارویی وجود دارد و این که این باکتری‌ها به طور گستردۀ از منابع محیطی، حیوانی و انسانی جدا شده‌اند، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین پروفایل قطعات محدود شونده و شناسایی با استفاده از یک روش سریع و در عین حال دقیق برای مشخص نمودن انواع شایع در منطقه‌ی جغرافیایی مورد نظر انجام گردیده است. در این مطالعه، از بین ۳۴ گونه‌ی NTM مورد بررسی، تایپ I. فورچیتوم با فراوانی ۸۲/۳۵ درصد بیشترین نمونه‌ی جدا شده از مجموعه نمونه‌های بالینی این منطقه بود و پس از آن، مایکوباکتریوم کانزاسی تایپ I و مایکوباکتریوم گوردونه‌ی تایپ I هر دو با ۵/۸۸ درصد و مایکوباکتریوم گوردونه‌ی تایپ II با ۲/۹۴ درصد مایکوباکتریوم ایتراسلولار با مطالعه‌ی Lee و همکاران برگردیده‌اند. این یافته‌ها با نتایج حاصل از مطالعات دیگر در مورد تایپ‌های شایع در هر منطقه به طور کامل یکسان نبود. در مطالعه‌ی NTM، بیشترین فراوانی مربوط به ایتراسلولار تایپ I با فراوانی ۲۶/۷ درصد و ایوتوم با فراوانی ۲۵ درصد بوده است (۵).

در مطالعه‌ی Ong و همکاران، تایپ I م. فورچیتوم با فراوانی ۳۰ درصد، M. اویوم ۱۱/۴۲ درصد، M. گوردونه‌ی تایپ I ۸/۵۷ درصد و M. کانزاسی تایپ I ۵/۷۱ درصد به عنوان گونه‌های با فراوانی بیشتر گزارش شده‌اند (۱۸). این تفاوت در

مایکوباکتریوم‌ها به طور معمول با روش‌های فنوتیپی در سطح گونه شناسایی می‌شوند؛ اما تشخیص بر این اساس دارای محدودیت‌هایی است (۶-۷). روش‌های جایگزین مانند HPLC (High-performance liquid chromatography) نیازمند تجهیزات ویژه و گران قیمت و نیز مقدار قابل توجهی از میکروارگانیسم می‌باشند (۱۴). امروزه Sequencing روش‌های مولکولار از جمله Mycobacteria و Inno-LipA, Accu probe برای شناسایی دقیق و سریع گونه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ اما این روش‌ها با وجود قدرت افتراق و تشخیص بالا، محدودیت‌هایی در استفاده به ویژه در کشورهای در حال توسعه به دلیل هزینه‌ی بالا و امکانات خاص دارد (۱۵-۱۶).

همچنین در دهه‌های گذشته، روش‌های رایج طبقه‌بندی مانند باکتریوفاژتایپینگ و سروتاپینگ با Ribotyping روش‌های ملکولی مانند Fingerprinting plasmid, PCR-based methods آنالیز قطعات محدود شونده‌ی DNA کروموزومی به وسیله‌ی (Pulsed-field gel electrophoresis) PFGE جایگزین گردیده است (۱۷). در این بین PCR-RFLP analysis یک روش دقیق و ارزان می‌باشد که تشخیص و طبقه‌بندی تایپ‌ها و حتی ساب تایپ مایکوباکتریوم‌ها را فراهم می‌آورد (۱۰-۱۱).

ژن‌های مختلفی از جمله hsp65, rpoB, dnaj و ۱۶S rRNA با این روش جهت شناسایی مایکوباکتریوم می‌توانند مورد هدف قرار گیرند (۹-۱۰). در این بین، ژن rpoB کد کننده‌ی زیر واحد آنزیم RNA پلیمراز به عنوان یک ژن مناسب برای

برای rRNA_{16S}، rRNA₆₅ و dnaj hsp₆₅ نیز انجام شد، اما به چندین آنزیم هضم کننده نیاز بود و همین امر، تفسیر قطعات حاصل را مشکل می‌ساخت. همچنین مطالعات دیگر که در مناطق مختلف صورت گرفته‌اند، تأیید کننده‌ی این است که rpoB یک ابزار قدرتمند شناسایی برای شناسایی NTM‌ها به ویژه (Rapidly growing mycobacteria) RGM ها و همچنین بررسی ارتباط بین گونه‌ای و درون گونه‌ای (Intra-interspecies) می‌باشد (۲۵-۱۹).

تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی می‌باشد که با تأمین اعتبار از معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به انجام رسید. بدین وسیله از این معاونت، کارکنان محترم آزمایشگاه مرجع سل، کارکنان و مدیران محترم گروه میکروب‌شناسی دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکر و قدردانی می‌گردند.

الگوی PRA ایزوله‌های یکسان از نظر فنوتیپی در مناطق مختلف جغرافیایی نیز دیده می‌شود. بر اساس روش به کار گرفته شده در این بررسی، ۱۰۰ درصد ایزوله‌ها قابل شناسایی بودند.

در مطالعه‌ی Kazumi و Mitarai گزارش شده است که سکانس ژن rpoB موجب بهبود سیستم تشخیص و شناسایی دقیق گونه‌های مایکوباکتریوم می‌گردد (۶). همچنین Lee و همکاران، ژن rpoB را جهت تشخیص و افتراق مایکوباکتریوم‌ها برای ۴۴ گونه، مورد استفاده قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که مایکوباکتریوم‌ها در سطح گونه به وسیله‌ی این روش قابل شناسایی هستند و همچنین توانایی تشخیص گونه و ساب تایپ‌های گوردونه، فورچیتوم، کانزاسی و گاستری را نیز دارا می‌باشد. در حالی که rRNA_{16S} در این موارد محدودیت دارد (۵).

مطالعه‌ی Ong و همکاران نشان داد که حساسیت PRA ژن rpoB برای تمایز و تشخیص مایکوباکتریوم PRA ۸۵/۶ درصد می‌باشد (۱۸). در مطالعات دیگر،

References

- Konig B, Tammer I, Sollich V, Konig W. Intra- and interpatient variability of the hsp65 and 16S-23S intergenic gene region in *Mycobacterium abscessus* strains from patients with cystic fibrosis. *J Clin Microbiol* 2005; 43(7): 3500-3.
- Lee AS, Jelfs P, Sintchenko V, Gilbert GL. Identification of non-tuberculous mycobacteria: utility of the GenoType Mycobacterium CM/AS assay compared with HPLC and 16S rRNA gene sequencing. *J Med Microbiol* 2009; 58(Pt 7): 900-4.
- Ellis SM. The spectrum of tuberculosis and non-tuberculous mycobacterial infection. *Eur Radiol* 2004; 14(Suppl 3): E34-E42.
- Griffith DE, Aksamit T, Brown-Elliott BA, Catanzaro A, Daley C, Gordin F, et al. An official ATS/IDSA statement: diagnosis, treatment, and prevention of nontuberculous mycobacterial diseases. *Am J Respir Crit Care Med* 2007; 175(4): 367-416.
- Lee H, Park HJ, Cho SN, Bai GH, Kim SJ. Species identification of mycobacteria by PCR-restriction fragment length polymorphism of the rpoB gene. *J Clin Microbiol* 2000; 38(8): 2966-71.
- Kazumi Y, Mitarai S. The evaluation of an identification algorithm for *Mycobacterium* species using the 16S rRNA coding gene and rpoB. *International Journal of Mycobacteriology* 2012; 1(1): 21-8.
- Nasr EB, Rezaei YH, Moghim S, Ghasemian SH, Zarkesh EH. Rapid and accurate identification of *Mycobacterium* tuberculosis complex and common non-tuberculous mycobacteria by multiplex real-time PCR targeting different housekeeping genes. *Curr Microbiol* 2012; 65(5): 493-9.

8. Foxman B, Zhang L, Koopman JS, Manning SD, Marrs CF. Choosing an appropriate bacterial typing technique for epidemiologic studies. *Epidemiol Perspect Innov* 2005; 2: 10.
9. Covert TC, Rodgers MR, Reyes AL, Stelma GN, Jr. Occurrence of nontuberculous mycobacteria in environmental samples. *Appl Environ Microbiol* 1999; 65(6): 2492-6.
10. Varma-Basil M, Garima K, Pathak R, Dwivedi SK, Narang A, Bhatnagar A, et al. Development of a novel PCR restriction analysis of the hsp65 gene as a rapid method to screen for the *Mycobacterium tuberculosis* complex and nontuberculous mycobacteria in high-burden countries. *J Clin Microbiol* 2013; 51(4): 1165-70.
11. Adekambi T, Drancourt M, Raoult D. The rpoB gene as a tool for clinical microbiologists. *Trends Microbiol* 2009; 17(1): 37-45.
12. Lee H, Bang HE, Bai GH, Cho SN. Novel polymorphic region of the rpoB gene containing *Mycobacterium* species-specific sequences and its use in identification of mycobacteria. *J Clin Microbiol* 2003; 41(5): 2213-8.
13. Neonakis IK, Gitti Z, Krambovitis E, Spandidos DA. Molecular diagnostic tools in mycobacteriology. *J Microbiol Methods* 2008; 75(1): 1-11.
14. Butler WR, Guthertz LS. Mycolic acid analysis by high-performance liquid chromatography for identification of *Mycobacterium* species. *Clin Microbiol Rev* 2001; 14(4): 704-26, table.
15. Tortoli E, Mariottini A, Mazzarelli G. Evaluation of INNO-LiPA MYCOBACTERIA v2: improved reverse hybridization multiple DNA probe assay for mycobacterial identification. *J Clin Microbiol* 2003; 41(9): 4418-20.
16. Cheunoy W, Prammananan T, Chaiprasert A, Foongladda S. Comparative evaluation of polymerase chain reaction and restriction enzyme analysis: two amplified targets, hsp65 and rpoB, for identification of cultured mycobacteria. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2005; 51(3): 165-71.
17. Tenover FC, Arbeit RD, Goering RV, Mickelsen PA, Murray BE, Persing DH, et al. Interpreting chromosomal DNA restriction patterns produced by pulsed-field gel electrophoresis: criteria for bacterial strain typing. *J Clin Microbiol* 1995; 33(9): 2233-9.
18. Ong CS, Ngeow YF, Yap SF, Tay ST. Evaluation of PCR-RFLP analysis targeting hsp65 and rpoB genes for the typing of mycobacterial isolates in Malaysia. *J Med Microbiol* 2010; 59(Pt 11): 1311-6.
19. Whang J, Lee BS, Choi GE, Cho SN, Kil PY, Collins MT, et al. Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism of the rpoB gene for identification of *Mycobacterium avium* subsp. *paratuberculosis* and differentiation of *Mycobacterium avium* subspecies. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2011; 70(1): 65-71.
20. Macheras E, Roux AL, Bastian S, Leao SC, Palaci M, Sivadon-Tardy V, et al. Multilocus sequence analysis and rpoB sequencing of *Mycobacterium abscessus* (*sensu lato*) strains. *J Clin Microbiol* 2011; 49(2): 491-9.
21. Simmon KE, Low YY, Brown-Elliott BA, Wallace RJ, Jr., Petti CA. Phylogenetic analysis of *Mycobacterium aurum* and *Mycobacterium neoaurum* with redescription of *M. aurum* culture collection strains. *Int J Syst Evol Microbiol* 2009; 59(Pt 6): 1371-5.
22. Adekambi T, Colson P, Drancourt M. rpoB-based identification of nonpigmented and late-pigmenting rapidly growing mycobacteria. *J Clin Microbiol* 2003; 41(12): 5699-708.
23. Kim BJ, Lee SH, Lyu MA, Kim SJ, Bai GH, Chae GT, et al. Identification of mycobacterial species by comparative sequence analysis of the RNA polymerase gene (rpoB). *J Clin Microbiol* 1999; 37(6): 1714-20.
24. Devulder G, Perouse de MM, Flandrois JP. A multigene approach to phylogenetic analysis using the genus *Mycobacterium* as a model. *Int J Syst Evol Microbiol* 2005; 55(Pt 1): 293-302.
25. Adekambi T, Berger P, Raoult D, Drancourt M. rpoB gene sequence-based characterization of emerging non-tuberculous mycobacteria with descriptions of *Mycobacterium bolletii* sp. nov., *Mycobacterium phocaicum* sp. nov. and *Mycobacterium aubagnense* sp. nov. *Int J Syst Evol Microbiol* 2006; 56(Pt 1): 133-43.

Identification of Non-Tuberculosis Mycobacteria Isolates by Polymerase Chain Reaction–Restriction Enzyme Analysis of 360-bp Fragment of *rpoB* Gene

Shima Hadifar¹, Sharareh Moghim PhD², Hajieh Gasemian-Safaei PhD³, Hosein Fazeli PhD⁴, Fariba Farid MD⁵, Mohsen Moghoofei¹, Mansour Sedighi¹, Bahram Nasr-Esfahani PhD³

Abstract

Original Article

Background: Diagnosis of mycobacterium genus provides a basis for investigating the epidemiology and pathogenesis of this group of bacteria. Regarding the prevalence of mycobacterial infection in Iran and because of the being neighborhood with countries among 22 high-burden countries, increasing attention to mycobacterial diseases and introducing molecular epidemiology of Mycobacteria seems to be necessary. Restriction Fragment Length Polymorphism Analysis of Polymerase Chain Reaction-Amplified Fragments (PCR-RFLP) is an inexpensive and accurate method providing diagnosis of mycobacterial species. The present study aimed to determine the common types of Mycobacteria in this geographical region by mentioned method.

Methods: 34 clinical isolates were collected and cultured and identified by phenotypic methods. A 360-bp fragment of the *rpoB* gene was amplified by PCR and then, PCR products were digested by the two enzymes, MspI and HaeIII. Digested fragments were analyzed by using 4% metaphor agarose gel electrophoresis.

Findings: Out of 34 species of nontuberculous mycobacteria (NTMs), *M. fortuitum* type I with the frequency of 82.35% was the most frequent type and *M. gordonaiae* type I and *M. kansasii* type I both with the frequency of 5.88% and *M. gordonaiae* type II and *M. intracellulare* both with the frequency of 2.94% were the next.

Conclusion: The PCR-RFLP analysis of *rpoB* gene used for identification of Mycobacteria provided valid results in this geographical area. In this study, *M. kansasii* type I (HaeIII: 90/205, MspI: 30/40/60/175) and *M. avium* (HaeIII: 270; MspI: 40/80/105) were identical to the patterns of some studies and different from others. This study demonstrated the high sensitivity (100%) of used PCR-RFLP analysis method for identification of Mycobacteria.

Keywords: Nontuberculous mycobacteria, Restriction Fragment Length Polymorphism Analysis of Polymerase Chain Reaction-Amplified Fragments (PCR-RFLP), *rpoB* gene, Identification

Citation: Hadifar Sh, Moghim Sh, Gasemian-Safaei H, Fazeli H, Farid F, Moghoofei M, et al. **Identification of Non-Tuberculosis Mycobacteria Isolates by Polymerase Chain Reaction–Restriction Enzyme Analysis of 360-bp Fragment of *rpoB* Gene.** J Isfahan Med Sch 2014; 31(266): 2131-8

* This paper is derived from a MSc thesis in Isfahan University of Medical Sciences.

1- MSc Student, Department of Microbiology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2- Assistant Professor, Nosocomial Infection Research Center AND Department of Microbiology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3- Associate Professor, Department of Microbiology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4- Assistant Professor, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center AND Department of Microbiology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

5- General Practitioner, Isfahan Provincial Tuberculosis Center, Deputy of Treatment, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

Corresponding Author: Bahram Nasr-Esfahani PhD, Email: nasr@hlmh.mui.ac.ir